

Pocketcorrectie bij een pacemaker of ICD

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort wordt u opgenomen voor een pocketcorrectie. In deze folder leest u hier meer over.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen wij daar nog extra rekening mee houden.

Een pocketcorrectie

Een pocket is een ruimte waar de pacemaker of ICD in zit. Bij een pocketcorrectie wordt er een nieuwe plek gezocht voor uw pacemaker of ICD. Dit wordt gedaan als er problemen zijn met de huid rondom de pacemaker of ICD of als u ongemak heeft van de plaats waar de pacemaker of ICD zit.

Vorbereiding

Als u al opgenomen bent in het ziekenhuis, wordt u in het ziekenhuis voorbereid op de behandeling.

Vervoer naar huis regelen

Na de pocketcorrectie mag u zelf geen voertuig besturen en geen gebruik maken van openbaar vervoer. We raden u daarom aan om tijdig vervoer naar huis te regelen.

Niet nuchter

U hoeft niet nuchter te zijn. U kunt ontbijten en/of lunchen.

Diabetes

Als u diabetes mellitus heeft en insuline spuit, mag u de gebruikelijke hoeveelheid insuline spuiten. Breng uw insulinepen, insuline en -naaldjes mee naar het ziekenhuis. Neem ook uw spullen mee voor het meten van uw bloedsuikers. U kunt de controles zelf blijven doen. Zo nodig wordt dit voor u gedaan op de afdeling.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen zoals u gewend bent, tenzij uw cardioloog anders met u heeft besproken.

Bloedverduunners

Als u bloedverduunners gebruikt, gelden de instructies hieronder.

- Acenocoumerol (Sintrommitis) of fenprocoumon (Marcoumar):
U hoort van de cardioloog òf en wanneer u hier tijdelijk mee moet stoppen. Als u moet stoppen geven wij dit door aan de Trombosedienst.
- (D)OAC's, zoals dabigatran (Pradaxa) of apixaban (Eliquis), rivaroxaban (Xarelto) en endoxaban (Lixiana): Uw cardioloog vertelt u òf en wanneer u hier tijdelijk mee moet stoppen.
- Overige bloedverdunnende medicijnen zoals clopidrogel (Plavix), acetylsalicylzuur (Aspirine), carbasalaatcalcium (Ascal), prasugrel (Efient) of ticagrelor (Brilique): Deze moet u blijven innemen zoals u gewend bent.

Bloedafname

Voor een pocketcorrectie moeten bepaalde waarden in het bloed goed zijn. Gebruikt u Sintrommitis (Acenocoumarol) of Marcoumar (Fenprocoumon) en wordt u begeleid door de trombosedienst? Dan is het belangrijk dat we weten hoelang het duurt voordat uw bloed stolt. Dit is de zogeheten INR-waarde. Daarom moet op de dag van opname uw bloed worden onderzocht, vóór u naar de afdeling komt.

Het secretariaat van de Cardiologie stuurt u per post of digitaal de laboratoriumbrief, samen met de brief voor uw opname. U komt 45 minuten voor de aangegeven tijd in de brief naar de afdeling Bloedafname in het ziekenhuis om bloed te laten prikken. De afdeling Bloedafname gaat om 07.00 uur open. Als u zich tussen 07.30- 08.30 uur moet melden, probeer dan op tijd bij de Bloedafname te zijn. Op de laboratoriumbrief staat dat het spoed is. Druk bij het laboratorium op de zogeheten cito-knop.

Als u nog vragen of twijfels heeft over het innemen van uw medicijnen, kunt u tijdens kantooruren bellen naar afdeling G1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, tel. (078) 654 29 52.

Meenemen naar het ziekenhuis

- Alle medicijnen die u gebruikt in de originele medicijnstrip.
- Voor 24 uur medicijnen en uw actuele medicijnlijst. Deze lijst kunt u krijgen bij uw apotheek. Het is belangrijk dat u deze lijst meebrengt. We scannen de lijst en voegen deze toe aan uw digitale patiëntendossier.
- Als u medicijnen slikt van de Trombosedienst, neemt u dan ook de medicijnkaart van de Trombosedienst mee
- De ingevulde en ondertekende reanimatieverklaring uit de folder 'Wel of niet reanimeren'.
- Telefoonnummer van uw contactpersoon.
- Toiletpullen, pantoffels of slippers en verdere benodigdheden voor als u een nacht in het ziekenhuis moet blijven.

Thuis laten

Tijdens de behandeling mag u geen sieraden dragen. Vergeet ook niet om uw ringen af te doen. We raden u aan om geen kostbare dingen naar het ziekenhuis mee te nemen. Als er iets zoek raakt, is het ziekenhuis hier niet aansprakelijk voor.

Opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op dagbehandeling G1, locatie Dordwijk. De dagbehandeling is een ruimte met bedden en behandelstoelen.



Afdeling dagbehandeling G1

De verpleegkundige vraagt u om een operatiejasje en -sokken aan te doen. Deze liggen voor u klaar op het nachtkastje. De verpleegkundige meet uw bloeddruk en uw temperatuur en het opnamegesprek vindt plaats.

De verpleegkundige brengt daarna een infuusnaaldje in uw arm in. Via dit infuusnaaldje wordt antibioticum gegeven. Uw borst en oksel aan de kant van de pacemaker of ICD, worden zo nodig geschoren. Ook kunt u een rustgevend tabletje krijgen. U krijgt vlak voor binnenkomst op de behandelkamer een operatiemuts op.

De pocketcorrectie

De pocketcorrectie gebeurt op de behandelkamer naast dagbehandeling G1. Onder plaatselijke verdoving haalt de cardioloog de pacemaker of de ICD uit de pocket. Zo nodig krijgt u pijnstilling via de infuusnaald.

Er wordt een nieuwe pocket gemaakt. De pacemaker of ICD wordt verplaatst. De draden blijven liggen in het hart. Daarna worden de pocket en de wond gesloten met hechtingen.



De behandelkamer

Na de pocketcorrectie

Na de pocketcorrectie komt u terug op dagbehandeling G1. Daar controleert de verpleegkundige uw bloeddruk en de wond. U heeft een paar uur bedrust. U mag meestal wel naar het toilet lopen.

De wond

Als de wond pijnlijk is, kunt u hiervoor paracetamol innemen volgens de instructies op de verpakking.

De eerste drie dagen na de behandeling moet de wond droog blijven. U mag dan niet douchen of in bad gaan.

U mag de witte pleister eventueel na drie dagen verwijderen. Deze mag ook blijven zitten. De bruine hechtpleister laat u zitten tot de eerste controle op de polikliniek. Dan wordt de wondcontrole gedaan.

Voorzichtig bewegen

De eerste dagen na de pocketcorrectie raden wij u aan om u niet te veel in te spannen. De wond heeft tijd nodig om te genezen. U mag uw arm voorzichtig bewegen.

Complicaties

Bloeduitstorting

Als er bij het openen van de huid een bloedvaatje is geraakt, ontstaat op die plaats een bloeduitstorting. Soms is het nodig om na de behandeling extra druk op de wond te geven, zodat het bloeden stopt. We leggen dan een 'zandzakje' op de wond. Dat zakje moet meestal een aantal uur blijven liggen.

Ontsteking

Een enkele keer komen er bacteriën in de wond die een ontsteking (infectie) veroorzaken. Meestal is dan antibioticum nodig.

Als de ontsteking tot in de pacemaker of ICD-pocket doordringt, moeten de pacemaker of ICD en de elektroden verwijderd worden. De cardioloog maakt dan een nieuw behandelplan voor u.

Een arts waarschuwen

We raden u aan uw wond goed in de gaten te houden. Overleg met uw cardioloog:

- Als de wond gaat nabloeden.
- Als er ineens een toenemende zwelling onder de pleister ontstaat.
- Bij problemen met de wond, zoals roodheid of vochtigheid van de huid rondom de wond.
- Bij koorts (boven de 38 graden).

Bij klachten als gevolg van de pocketcorrectie belt u:

Op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur:

- Na opname afdeling G1, tel. (078) 654 29 52.
- Na opname afdeling D1, tel. (078) 652 34 34.

U kunt ook tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Cardiologie bellen, tel. (078) 652 33 60.

Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp: (078) 652 32 10.

Patiënten van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem kunnen bellen naar de Spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis, tel. (0183) 64 44 44.

In uiterste nood belt u alarmnummer 112.

Waarschuwing

Apple waarschuwt op hun website om de iPhone 12 minstens 15 centimeter van pacemakers vandaan te houden. Als de iPhone 12 op een MagSafe is aangesloten wordt een afstand van 30 centimeter van de pacemaker geadviseerd.

Pacemakers zouden slecht kunnen reageren op de magneten in de iPhone 12.

Tot slot

Als u verhinderd bent, wilt u ons dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren bellen?

De afgesproken tijd voor de pocketcorrectie is een richttijd. Het kan voorkomen dat u moet wachten voordat u aan de beurt bent.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Cardiologie, tel. (078) 652 33 60. We beantwoorden uw vragen graag.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website www.asz.nl.

Behandelpadapp

Download de gratis app 'Patient Journey'. Accepteer de push notificaties en zoek bij zorginstelling naar 'Asz Behandelpad'. Daarna kiest u bij behandeling voor Welkom bij het Hartcentrum (onder het specialisme Cardiologie) en druk op start. Daar vindt u onder andere alle informatie over het hart, de onderzoeken en behandelingen, de afdelingen van ons Hartcentrum, folders, onze cardiologen, informatie na ontslag etc.



Download onze app

Welkom bij het Hartcentrum

Geef hier uw mening over onze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
juni 2023
pavo 1689