

Röntgenonderzoek van de baarmoeder en de eileiders

Hystero salpingografie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort heeft u een afspraak voor een röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders. In deze folder leest u hier meer over.

Doel van het onderzoek

Een HSG is een röntgenonderzoek waarbij met contrastvloeistof een foto gemaakt wordt van uw baarmoeder en de eileiders. Het wordt gedaan om te kijken of de eileiders doorgankelijk zijn. Het onderzoek kan om een aantal redenen gedaan worden. Bijvoorbeeld als het niet lukt om zwanger te worden, na een vroeggeboorte of bij achter elkaar optredende miskramen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De voorbereiding

Het onderzoek mag niet worden gedaan als u zwanger bent. Het moet daarom gebeuren vlak na de menstruatie en vóór de eisprong.

Het is belangrijk dat het zeker is dat u op het moment van het onderzoek **niet zwanger** bent. Als u toch zwanger bent, dan zit er een bevruchte eicel in uw baarmoeder.

Bij het inbrengen van het contrastmiddel kan de eikel buiten de baarmoeder terechtkomen. Dan ontstaat een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Dit heeft ernstige gevolgen!

Menstruatiecyclus

Het onderzoek moet vóór cyclusdag 11 gedaan worden. Dan heeft u nog geen eisprong gehad en kunt u dus niet heel pril zwanger zijn. De eerste dag van de menstruatie is cyclusdag 1. Op de eerste dag van de menstruatie belt u naar de polikliniek Gynaecologie, tel. (078) 654 64 46 om een afspraak te maken voor het onderzoek.

Als u het prettig vindt, kunt u uw partner of een naaste meenemen. Deze mag bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen. U kunt ze dan na het onderzoek ook niet vergeten.

Pijnstilling

1 uur voor het onderzoek neemt u in overleg met uw arts de pijnstilling die u voorgeschreven heeft gekregen.

Antibiotica

Als u in het verleden een chlamydia infectie heeft gehad, neemt u de ochtend van de HSG de voorgeschreven antibiotica in. Een recept voor deze medicijnen krijgt u in overleg met uw arts.

De dag van het onderzoek

U meldt zich 10 minuten voor het onderzoek bij de afdeling Radiologie. Wilt u doorgeven:

- Als u overgevoelig bent voor jodium of contrastvloeistof.
- Als u in het verleden een eileiderontsteking heeft gehad.
- Als u koorts heeft boven 38,2°C.
- Als u bloedverlies of abnormale afscheiding heeft.
- Als u denkt zwanger te kunnen zijn.

Het onderzoek

U wordt naar een kleedkamer gebracht. De röntgenlaborant vraagt u om de kleding van uw onderlichaam uit te trekken. Daarna gaat u op de onderzoekstafel liggen. U ligt op uw rug met opgetrokken benen.

Een gynaecoloog brengt vervolgens een speculum (eendenbek) in uw vagina. Via het speculum wordt een dun slangetje in uw baarmoeder gebracht. Na het inbrengen wordt een klein ballonnetje opgeblazen. Hierdoor blijft het slangetje tijdens het onderzoek zitten in de baarmoeder.

Via het slangetje wordt contrastvloeistof in uw baarmoeder en eileiders gespoten. Daarna worden de foto's gemaakt. Met de oliehoudende contrastvloeistof worden uw baarmoeder en eileiders zichtbaar gemaakt op de röntgenfoto's.

Tijdens het inbrengen van het buisje en het inspuiten van de contrastvloeistof kunt u 'menstruatiepijn' voelen.

Als de foto's gemaakt zijn, worden het buisje en het speculum weer verwijderd. U kunt zich dan weer aankleden. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De ingespoten contrastvloeistof verspreidt zich geleidelijk in uw buik en wordt in uw bloed opgenomen. Later plast u de contrastvloeistof gewoon weer uit.

Soms moet 1 tot 4 uur later nog een controlefoto gemaakt worden om te kijken hoe het contrastvloeistof zich heeft verspreid. U hoort van de gynaecoloog of de controlefoto bij u nodig is.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gynaecoloog en een röntgenlaborant.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u wat slijm, bloed of jodium verliezen via uw vagina. Dat is normaal. U kunt hiervoor een maandverband meenemen naar het ziekenhuis. De rest van de dag kunt u nog wat menstruatiepijn hebben.

De uitslag

Als u het onderzoek afspreekt, kunt u tegelijkertijd een belafpraak laten inplannen voor één week na het onderzoek. Uw behandelend arts kan dan de uitslag met u bespreken.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u dan zo snel de polikliniek Gynaecologie bellen? De opengevallen plaats kunnen we dan voor een andere patiënt gebruiken.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar de naar de polikliniek Gynaecologie, tel. (078) 654 64 46. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website www.asz.nl.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2022
pavo 0435