

Röntgenonderzoek van de baarmoeder en de eileiders

Hystero salpingografie

informatie

Albert Schweitzer ziekenhuis
Afdeling Radiologie
april 2010
pavo 0435



Inleiding

In deze folder vindt u informatie over het röntgenonderzoek van de baarmoeder en de eileiders. Dit onderzoek wordt hystero salpingografie (HSG) genoemd.

U heeft een afspraak voor dit onderzoek

op: _____ dag _____ om _____ uur.

Het onderzoek gebeurt op de afdeling Radiologie van locatie:

- Dordwijk, polikliniek nummer 14
- Sliedrecht, souterrain
- Zwijndrecht, na hoofdingang 1^e gang links, polikliniek nummer 2

Als het onderzoek op locatie Dordwijk gebeurt, kunt u zich ongeveer een kwartier voor aanvang van het onderzoek melden bij de polikliniek Gynaecologie. De polikliniekassistente geeft uw dossier mee. Met het dossier gaat u naar de afdeling Radiologie waar het onderzoek plaatsvindt.

Als het onderzoek op locatie Sliedrecht of Zwijndrecht gebeurt, kunt u meteen doorlopen naar de afdeling Radiologie.

informatie

Doel van het onderzoek

Een HSG is een röntgenonderzoek waarbij met behulp van contrastmiddel een foto gemaakt wordt van uw baarmoeder en de eileiders. Het onderzoek wordt gedaan om te kijken of de eileiders doorgankelijk zijn en om de vorm en ligging van de baarmoeder te bekijken.

Het onderzoek kan gedaan worden om een aantal redenen, bijvoorbeeld als het niet lukt om zwanger te worden, na een vroeggeboorte of bij achter elkaar optredende miskramen.

De voorbereiding

Het onderzoek mag niet worden gedaan als u zwanger bent. Het moet daarom gebeuren vlak na de menstruatie en vóór de eisprong.

U mag vier dagen voor het onderzoek geen geslachts-gemeenschap hebben.

Het is belangrijk dat het zeker is dat u op het moment van het onderzoek **niet zwanger** bent. Als u toch zwanger bent, dan zit er een bevruchte eicel in uw baarmoeder. Bij het inbrengen van het contrastmiddel kan de eicel buiten de baarmoeder terechtkomen, waardoor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap ontstaat. Dit heeft ernstige gevolgen!

Menstruatiecyclus

De eisprong is bij vrouwen met een normale menstruatiecyclus van 28 dagen op de 14^e dag, gerekend vanaf de eerste dag van de menstruatie. Het onderzoek moet tussen de 8^e en 12^e dag uitgevoerd worden.

Is uw menstruatiecyclus anders, dan vindt het onderzoek eerder of later plaats. Bij een cyclus van 26 dagen bijvoorbeeld moet het onderzoek tussen 6^e en de 10^e dag plaatsvinden en bij een cyclus van 31 dagen tussen de 11^e en de 15^e dag.

informatie

Op de eerste dag van de menstruatie belt u met de polikliniek Gynaecologie om een afspraak te maken voor het onderzoek. Valt de eerste dag van de menstruatie in het weekend of op een feestdag dan belt u de eerst komende werkdag op.

Als u het prettig vindt, kunt u uw partner of een naaste meenemen. Deze mag bij het onderzoek aanwezig zijn.

Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen. U kunt ze dan na het onderzoek ook niet vergeten.

De dag van het onderzoek

Op de afgesproken datum en tijd kunt u zich melden bij de afdeling Radiologie waar het onderzoek plaatsvindt. We willen u vragen door te geven:

- Als u overgevoelig bent voor jodium of contrastvloeistof.
- Als u in het verleden een eileiderontsteking heeft gehad.
- Als u koorts heeft boven 38,2 °C.
- Als u bloedverlies of abnormale afscheiding heeft.
- Als u denkt zwanger te kunnen zijn.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Bij het eerste deel van het onderzoek wordt contrastvloeistof ingebracht en worden gelijktijdig röntgenfoto's gemaakt. Soms wordt bij het tweede deel van het onderzoek, één tot vier uur later, alleen een controlefoto gemaakt. U hoort van de gynaecoloog of de controlefoto bij u nodig is.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gynaecoloog en een laborant. Het kan zijn dat niet uw eigen gynaecoloog, maar één van zijn of haar collega's het onderzoek uitvoert.

informatie

Eerste deel van het onderzoek:**het maken van de foto's met behulp van contrastvloeistof**

U wordt naar een kledkamer gebracht. De laborante vraagt u om de kleding van uw onderlichaam uit te trekken. Daarna neemt u plaats op de onderzoekstafel. U ligt daarbij op uw rug met opgetrokken benen.

Een gynaecoloog brengt vervolgens een speculum (eendebek) in uw vagina. Via het speculum wordt een dun buisje in uw baarmoeder gebracht. Het buisje wordt vastgezet aan uw baarmoedermond. U voelt een kort pijnlijk prikje. Via het buisje wordt contrastvloeistof in uw baarmoeder en eileiders gespoten, waarna de foto's worden gemaakt.

Met behulp van de contrastvloeistof worden uw baarmoeder en eileiders zichtbaar gemaakt op de röntgenfoto's. Tijdens het inbrengen van het buisje en het inspuiten van de contrastvloeistof kunt u 'menstruatiepijn' voelen.

Als de foto's gemaakt zijn, wordt het buisje en het speculum weer verwijderd. U kunt zich dan weer aankleden. Dit eerste gedeelte van het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten. De ingespoten contrastvloeistof verspreidt zich geleidelijk in uw buik en wordt in uw bloed opgenomen. Later plast u de contrastvloeistof gewoon weer uit.

De laborant vertelt u het tijdstip voor het maken van de controlefoto. U kunt daarna de afdeling Radiologie verlaten, eventueel kunt u naar huis.

Tweede deel van het onderzoek: het maken van de controlefoto

Op het afgesproken tijdstip, één tot vier uur na het inbrengen van de contrastvloeistof, meldt u zich weer bij de afdeling Radiologie. Er wordt nog een röntgenfoto gemaakt, om te kijken of de contrastvloeistof zich in uw buik verspreidt. Dit is een gewone röntgenfoto, hierbij wordt niets meer ingebracht. Na het maken van deze foto kunt u het ziekenhuis verlaten.

informatie

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u wat slijm, bloed of jodium verliezen via uw vagina. Dat is normaal. U kunt hiervoor een maandverband meenemen naar het ziekenhuis. De rest van de dag kunt u nog wat menstruatiepijn hebben.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u meestal direct van de gynaecoloog die het onderzoek heeft uitgevoerd. Na het onderzoek maakt u op de polikliniek Gynaecologie een vervolgspraak met uw eigen gynaecoloog.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u dit dan zo snel mogelijk laten weten bij de polikliniek Gynaecologie? De opgevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 -16.00 uur bellen met de polikliniek Gynaecologie.

- locatie Dordwijk (078) 654 64 46
- locatie Sliedrecht (0184) 43 42 46
- locatie Zwijndrecht (078) 654 11 78

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website www.asz.nl

informatie