

Allergietest

Op de longfunctie-afdeling

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak op de Longfunctie-afdeling voor een 'allergietest'. In deze folder leest u hier meer over.

De allergietest

Mogelijk worden de klachten van uw luchtwegen voor een deel veroorzaakt door allergieën. Met deze test kunnen we de meest voorkomende inhalatie-allergenen opsporen die effect hebben op uw luchtwegen.

U krijgt hiervoor druppeltjes met verschillende allergeenvloeistoffen op uw onderarm. Hier wordt dan kort en oppervlakkig in geprikt. Uw huid kan hierop reageren en er kan een soort licht jeukend muggenbultje ontstaan. Dit verdwijnt binnen 24 uur. Het onderzoek duurt 30 minuten.

Vorbereiding thuis

- Op de dag van de test mag u geen crème of bodylotion gebruiken op de armen.
- Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus voor het onderzoek eten en drinken zoals u gewend bent.

Meenemen naar het ziekenhuis

Het is belangrijk dat de longfunctieanalist weet welke medicijnen u gebruikt. Neemt u daarom een recent medicijnoverzicht van de apotheek mee naar het onderzoek. Als u dit niet heeft, dan kunt u ook uw longmedicijnen of de doosjes meenemen.

Medicijnen waarmee u moet stoppen

Voor het goed slagen van de test moet u tijdelijk stoppen met het innemen van medicijnen tegen allergie/hooikoorts (antihistaminica).

Hieronder ziet u een lijst waarop staat met welke medicijnen u moet stoppen en hoe lang van tevoren.

Antihistamine tabletten (tegen allergie, of andere aandoeningen o.a. ook reistabletten)

Minimaal 72 uur voor allergenentest niet meer innemen:

- Aerius (Desloratadine)
- Allerfre (Loratadine)
- Atarax (Hydroxizine)
- Cinnipirine (Cinnarizine)
- Claritine (Loratadine)
- Cyclizine (Cyclizine)
- Dramamine (Dimenhydrinaat)
- Emesafene (Meclozine/Pyridoxine)
- Hydroxyzine (Hydroxyzine)
- Kestine (Ebastine)
- Ketotifen (Ketotifen)
- Mebhydroline (Mebhydroline)
- Mizollen (Mizolastine)
- Phenergan (Promethazine)
- Polaramine (Dexchloeeniramine)
- Promethazine (Promethazine)
- Ranitidine (Zantac)
- Rupafin (Rupatadine)
- Semprex (Acrivastine)
- Suprimal (Meclozine)
- Tavegil (Clemastine)
- Telfast (Fexofenadine)
- Tinset (Oxatomide)
- Triludan (Terfenadine)

- Xyzal (Levocetirizine)
- Zyrtec (Cetirizine)
- Andere antihistamine tabletten (tegen allergie).
- **Corticosteroïde zalf**
Niet op de onderarmen smeren op de dag van de test.

Met neussprays en oogdruppels en overige medicatie hoeft u NIET te stoppen voor de test.

Als u antihistaminica (medicijnen tegen allergie/hooikoorts) gebruikt die niet op deze lijst staan, belt u dan voor overleg naar de Longfunctie-afdeling. Ook belt u bij twijfel naar de longfunctie-afdeling, tel. (078) 652 33 58.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Na het onderzoek

Er zijn geen bijwerkingen van de allergietest te verwachten. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

Na afloop van het onderzoek kunt u weer naar huis, naar uw werk, naar uw afspraak bij de longarts of als u bent opgenomen in het ziekenhuis, terug naar de verpleegafdeling.

Uitslag

De resultaten van de onderzoeken worden doorgegeven aan uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw eerstvolgende afspraak.

Tot slot

Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Bel dan zo spoedig mogelijk naar de polikliniek Longgeneeskunde. Uw plaats kunnen we dan voor een andere patiënt gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Longgeneeskunde, tel. (078) 652 33 28. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2024
pavo 1837