

Behandelen van plaatselijke kaalheid

Met DPCP

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

De dermatoloog heeft met u afgesproken dat u voor uw plaatselijke kaalheid (ook wel alopecia areata genoemd) behandeld gaat worden met DPCP (voluit: diphenylcyclopropenon).

U leest in de folder wat DPCP precies doet, hoe het wordt gebruikt en wat de mogelijke bijwerkingen zijn.

Wat is DPCP?

DPCP is een stof die wordt opgelost in aceton. Het wordt gebruikt bij patiënten die uitgebreide vormen van alopecia areata hebben en die onvoldoende reageren op andere behandelingen.

Bij alopecia is er sprake van een plaatselijke ontstekingsreactie rond de haarzakjes. Daardoor vallen er haren uit en ontstaat plaatselijke kaalheid. Vaak valt een deel van het hoofdhaar uit, maar ook wenkbrauwen, baard-, oksel- en schaamhaar kunnen uitvallen. De oorzaak hiervan is niet bekend.

Goede resultaten, maar niet geregistreerd

DPCP is nog niet geregistreerd als geneesmiddel, maar uit onderzoek blijkt dat het goed kan werken bij deze vorm van kaalheid. Het wordt sinds 1989 in Nederland bij deze huidziekte toegepast.

Bij de helft van de patiënten werkt het redelijk goed tot goed. Ook zijn er geen of bijna nooit ernstige en blijvende bijwerkingen.

Intensieve behandeling

Het is een intensieve behandeling waarbij u wekelijks voor behandeling naar de polikliniek moet komen.

U moet zich hiervan bewust zijn en goed gemotiveerd zijn voordat u start met de DPCP behandeling.

Allergische reactie

Als DPCP wordt aangebracht, veroorzaakt het een allergische reactie van de huid. Er ontstaat eczeem en uw huid wordt rood, schilferig en gaat jeuken. Deze klachten zijn lastig, maar onlosmakelijk verbonden met de behandeling. Het is de bedoeling dat uw huid allergisch reageert; daardoor zal er weer haar gaan groeien op de kale plekken.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, borstvoeding geeft of een kinderwens heeft, mag u niet behandeld worden met DPCP. Overleg dan met uw arts.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Behandeling

U komt voor uw behandeling met DPCP naar de polikliniek Dermatologie.

De behandeling bestaat uit twee fasen.

- **Fase 1**

Eerst wordt u overgevoelig gemaakt voor DPCP door **eenmalig** een **relatief hoge concentratie** DPCP op een hele plek op uw hoofd of arm aan te brengen. Uw huid reageert dan met eczeem. Als dit niet gebeurt, wordt deze fase herhaald.

- **Fase 2**

Na de eczeemreactie wordt deze in stand gehouden door **wekelijks een zeer lage concentratie** DPCP aan te brengen op de kale huid. De concentratie wordt geleidelijk opgehoogd op geleide van de reactie van uw huid.

Steeds mag er maar een mild eczeem ontstaan met roodheid en/of jeuk die ongeveer 36 uur aanhoudt. Bij een te heftige reactie of een reactie die te lang aanhoudt, raden we u aan naar de polikliniek Dermatologie te bellen of buiten kantooruren naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Bij een volgende behandeling vragen we u altijd of u een reactie heeft gehad zoals jeuk, huiduitslag en schilfering.

Leefregels

Na het aanbrengen moet de behandelde plek voor minimaal acht uur “lichtdicht” worden afgeplakt of beschermd (door bijvoorbeeld een muts). Zo kan er geen licht bijkomen.

De behandelde plekken mogen *24 uur* niet nat worden. U mag ook niet in de sauna.

U moet voorzichtig zijn met het aanraken van de huid die net is ingesmeerd, omdat dit ook een reactie kan veroorzaken op de gezonde huid.

Resultaten

De verwachting is dat na acht tot twaalf weken behandelen, uw haar weer gaat groeien. DPCP werkt helaas niet voor iedereen.

Ook als de behandeling wél succesvol is, bestaat er (net als voorheen) nog steeds de kans dat de kaalheid terugkomt.

Bijwerkingen

- Als uw huid té heftig reageert kunnen er in fase 1 blaren ontstaan. Ook kunt u heftige jeuk krijgen en kunnen de lymfklieren in de buurt van de behandelde plek opgezwollen en pijnlijk zijn.
- Het kan voorkomen dat er eczeem ontstaat op heel andere plaatsen. Ook kunnen er een soort galbulten ontstaan.
- Door de eczeem kunnen er huidverkleuringen ontstaan en wordt de huid lichter.
- Door de behandeling kunnen griepklachten verergeren.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
april 2024
pavo 1278