

Intercostaal blokkade

Behandeling van pijn bij kanker bij het
Pijnbehandelcentrum

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een intercostaal blokkade. In deze folder leest u hier meer over.

Intercostaal blokkade

Een intercostaal blokkade is een behandeling van pijn in de flank of de borstkas bij een tumor of uitzaaïing van de tumor in de borstkas. Het gaat vaak om pijn in het verloop van de aangedane zenuw.

Met röntgendoorlichting zoekt de pijnspecialist de zenuw bij de pijnlijke rib. Via de rug brengt hij daarna een naald naar deze zenuw. Hierdoor wordt vervolgens een vloeistof ingespoten (fenol 6% in water) die de zenuw uitschakelt. Dit zorgt vaak direct voor pijnvermindering.

Vorbereiding

U heeft ter voorbereiding een gesprek bij uw arts over de behandeling, resultaten en complicaties.

We adviseren u om uw partner of een familielid mee te nemen.

Nuchter zijn

- Als u voor 12.00 uur wordt behandeld, moet u nuchter zijn vanaf 24.00 uur de avond ervoor.
- Neem uw medicijnen in. Als u bloedverdunders gebruikt heeft uw behandelaar aparte afspraken hierover gemaakt met u.
- Wij raden u af om vooraf te roken.
- Als u diabetes heeft, moet u dit aangeven. Uw arts zal u adviseren wat u vooraf moet doen.

Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, moet u dat vooraf aan uw pijnspecialist te vertellen.

Geen sieraden en make-up etc.

Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, piercings, nagellak of make-up mag dragen. Ook mag u op de dag van de behandeling geen bodylotion gebruiken.

Wilt u ervoor zorgen als u gelnagels draagt dat er op één nagel van uw hand of voet geen gelnagel zit? Het meten van het zuurstofgehalte in het bloed is namelijk niet mogelijk bij gelnagels.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De behandeling

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier krijgt u een operatiejasje aan. Daarna gaat u naar de operatie-afdeling.

Op de operatie-afdeling neemt u plaats op de behandeltafel. Er wordt op indicatie een infuusnaaldje in uw arm gebracht.

Met röntgendoorlichting wordt een naald voorzichtig opgevoerd naar de zenuw bij de rib. Ter controle wordt contrastvloeistof gespoten om te kijken of de naald in de juiste positie staat. Daarna wordt de fenol bij de zenuw gespoten.

Hierdoor wordt de zenuw uitgeschakeld waardoor de pijn vermindert. Voor deze behandeling ligt u ongeveer een half uur op uw buik.

Soms voert de arts alleen maar een blokkade uit om een diagnose te kunnen stellen. In dat geval spuit de arts alleen een kortdurend verdovingsmiddel om te kijken of deze tumor uw pijn veroorzaakt.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Als alles goed gaat brengt de verpleegkundige u hierna naar de afdeling.

De behandeling kan de volgende bijwerkingen hebben:

- Ademhalingsproblemen. Tijdens de behandeling kan het longvlies aangeprikt worden waardoor u pijn krijgt bij de ademhaling of benauwd wordt. De arts zal een controlefoto laten maken van uw longen en zo nodig aanvullende behandeling regelen.
- Napijn.

We raden u aan om uw temperatuur te controleren. Bij een oplopende temperatuur boven de 38°C belt u de arts (zie kopje arts waarschuwen).

Controle

Daarna wordt u verwezen naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts kan altijd opnieuw contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum als uw pijn toeneemt.

Een arts waarschuwen

Bij de volgende klachten belt u met het Pijnbehandelcentrum:

- Koorts (oplopende temperatuur boven de 38°C).
- Infectie (roodheid, pus, pijn, warme huid bij de insteekopening van de naald).
- Problemen of pijn bij ademhaling.
- Benauwdheidsklachten.
- Onbegrepen klachten.

Van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en tussen 13.00-16.30 uur belt u het Pijnbehandelcentrum, tel. (078) 654 22 19.

's Avonds en in het weekend belt u bij acute problemen naar de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (078) 652 32 10.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en tussen 13.00-16.30 uur bellen naar het Pijnbehandelcentrum, tel. (078) 654 22 19.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
december 2023
pavo 0807