

Vaccinatie tegen tetanus

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U bent zojuist behandeld aan een verwonding. Door uw verwonding loopt u risico op een besmetting met tetanus. Daarom heeft u een tetanusinjectie gekregen. In deze folder leest u wat tetanus is en of u na vandaag nog extra injecties nodig heeft.

Wat is tetanus?

Tetanus is een infectieziekte die door de bacterie *Clostridium tetani* wordt veroorzaakt. Deze bacterie zit in de grond, in straatvuil en in uitwerpselen van dieren. Besmetting met tetanus kan ernstige gevolgen hebben. In het lichaam maakt deze bacterie een gifstof die verlammingen veroorzaakt. De ziekte begint meestal in de kaakspieren en breidt zich uit. Tetanus is moeilijk te behandelen en kan een dodelijke afloop hebben.

Wanneer bent u voor het laatst ingeënt?

Als kind bent u waarschijnlijk ingeënt. In Nederland worden kinderen namelijk standaard gevaccineerd tegen tetanus. Dit is de T van de DKTP-inenting. De laatste DKTP-inenting wordt gegeven als een kind negen jaar is.

Verder is het mogelijk dat u (daarna) een injectie heeft gekregen omdat u naar het buitenland bent geweest. Voor sommige (verre) landen zijn bepaalde vaccinaties verplicht of sterk aanbevolen.

Hoeveel tetanusinjecties heeft u nodig?

Door uw verwonding loopt u risico op een besmetting met tetanus. Afhankelijk van uw situatie heeft u één of meer tetanusinjecties nodig om een besmetting te voorkomen. Dit hangt onder andere af van uw leeftijd, uw weerstand en uw laatste vaccinatie.

Volwassenen

- **U heeft nog nooit een tetanusinjectie gekregen:**
u krijgt een injectie met antistoffen en een injectie met het tetanusvaccin. Over een maand en over een halfjaar heeft u nog een injectie nodig. Uw huisarts kan deze injecties geven. Hiervoor krijgt u een recept mee.
- **U heeft niet het volledige vaccinatietraject doorlopen:**
u krijgt alsnog alle injecties die u gemist heeft. Zo nodig heeft u over een maand en over een halfjaar nog een injectie nodig. Uw huisarts kan deze injecties geven. Hiervoor krijgt u een recept mee.
- **U heeft ooit een tetanusinjectie gekregen, maar u heeft hiervan geen bewijs meer:**
u krijgt een injectie met antistoffen. Afhankelijk van uw geboortedatum krijgt u ook een injectie met het tetanusvaccin. Dit geldt voor mannen die voor 01-01-1936 geboren zijn en vrouwen die voor 01-01-1950 geboren zijn.

- **U heeft langer dan 10 jaar geleden een tetanusinjectie gekregen en u heeft een bewijs hiervan:**
u krijgt een injectie met het tetanusvaccin.
- **U heeft een verminderde weerstand door een specifieke aandoening (de arts zal dit met u bespreken):**
u krijgt een injectie met antistoffen en een injectie met het tetanusvaccin. Over een maand en over een halfjaar heeft u nog een injectie nodig. Uw huisarts kan deze injecties geven. Hiervoor krijgt u een recept mee.

Kinderen

Of uw kind een injectie nodig heeft is afhankelijk van leeftijd en aantal inentingen dat al gegeven is.

- **Kinderen van 0 tot 4 maanden:**
uw kind krijgt een injectie met antistoffen. Heeft u kind de vorige DKTP-vaccinatie langer dan 14 dagen geleden gekregen? Belt u dan uw consultatiebureau om de volgende DKTP-vaccinatie te vervroegen; bij voorkeur binnen 1 week.
- **Kinderen van 4 tot 11 maanden:**
uw kind krijgt geen injectie als hij de DKTP-vaccinaties bij 2, 3 en 4 maanden heeft gekregen. Indien uw kind een vaccinatie gemist heeft, krijgt hij nu alsnog een injectie.
- **Kinderen vanaf 12 maanden:**
uw kind krijgt geen injectie als hij vier DTKP-vaccinaties én de revaccinaties bij 4 jaar en 9 jaar heeft gekregen. Indien uw kind een vaccinatie of revaccinatie gemist heeft, krijgt hij nu alsnog een injectie.

Als meerdere injecties nodig zijn

Als u na een maand en na een ½ jaar een vervolginjectie nodig heeft, krijgt u een recept mee. Voor het toedienen van deze injecties kunt u terecht bij uw huisarts.

Herinnering voor in uw agenda:

datum:	datum:	datum:
Injectie antistoffen + 1e injectie met tetanusvaccin	1 maand later een 2e injectie met tetanusvaccin	6 maanden na injectie 2 een 3e injectie met tetanusvaccin

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling Spoedeisende Hulp van locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10. Deze afdeling is 24 uur bereikbaar.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2021
pavo 0376