

Pleurapunctie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding


De arts heeft met u besproken dat er bij u pleuravocht weggenomen gaat worden. Dit wordt ook wel een pleurapunctie genoemd. U heeft hiervoor een afspraak

op: _____ dag _____ om _____ uur.

Dit vindt plaats op de afdeling Longfunctie van **locatie Dordwijk**.

Wat is pleuravocht?

Om uw longen liggen twee vliezen (pleurabladen). Het binnenste vlies heet het longvlies, het ligt direct om de long en is ermee vergroeid. Het buitenste vlies heet het borstvlies, het ligt tegen de binnenwand van de borstkas. Tussen beide vliezen zit een denkbeeldige ruimte, de pleuraholte. Deze ruimte is luchtdicht afgesloten (vacuüm) en is gevuld met een dun laagje vocht.



Afb. 1: De longen en de longvliezen^(*)

Door verschillende oorzaken kan zich extra vocht ophopen tussen deze vliezen. Dit noemen we pleuravocht. De meest voorkomende klachten daarbij zijn benauwdheid en hoesten.

Doel van de pleurapunctie

Bij een pleurapunctie nemen we pleuravocht weg:

- voor onderzoek naar de oorzaak van het toegenomen vocht
- en/of om uw longen te ontlasten, zodat uw klachten afnemen.

Verderop in de folder leest u hoe de punctie zal verlopen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereiding

- U hoeft **niet** nuchter te zijn voor het onderzoek.
- Medicijnen

Als u **bloedverdunnende medicijnen** gebruikt, bespreekt de dokter die het onderzoek aanvraagt met u of u moet stoppen met het gebruik hiervan, en zo ja, hoeveel dagen vóór het onderzoek.

Als dit niet met u is besproken, belt u dan naar de afdeling Longfunctie om dit aan te geven.

Bent u onder behandeling van de Trombosedienst? Dan moet u vooraf aan het onderzoek bloed laten prikken (INR-waarde).

Hiervoor heeft u een bloedprikformulier meegekregen. U mag op de afdeling Bloedafname op de CITO-knop drukken.

- Regelen van vervoer naar huis
Het onderzoek heeft geen invloed op de rijvaardigheid, maar gezien de klachten die u na het onderzoek kunt krijgen, is het wenselijk om door iemand naar huis gebracht te worden.

De pleurapunctie

Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u rechtop zit op de rand van de onderzoekstafel of van het bed. Uw voeten steunen daarbij op een stoel of kruk.

De arts bepaalt met een echografie de juiste punctieplaats en voert daarna de punctie uit. Een echografie is een onderzoek waarbij met geluidsgolven een beeld wordt verkregen van organen en weefsels.

Afhankelijk van de hoeveelheid van het pleuravocht en de reden van het onderzoek zijn er twee mogelijkheden:

- Er moet voor verder onderzoek wat vocht worden afgenomen met behulp van een dunne naald. In dit geval is een verdovingsprik meestal pijnlijker dan de punctie zelf. Daarom geven we geen verdoving. De punctie duurt minder dan een minuut.
- Er moet een grotere hoeveelheid vocht worden afgenomen om uw longen te ontlasten. In dat geval krijgt u wel een injectie met plaatselijke verdoving. Daarna wordt met een dunne katheter (dun slangetje) vocht uit de pleuraholte afgevoerd.

Het verwijderen van het vocht duurt, afhankelijk van de hoeveelheid vocht, ongeveer tien minuten. Na het onderzoek gaat er een pleister op het wondje. Dit mag er de volgende dag weer af.

Risico's en mogelijke complicaties

De kans op problemen door een pleurapunctie zijn laag. In zeldzame gevallen kan een bloeding, een klaplong of een infectie optreden. Vanzelfsprekend voeren we de procedure zo zorgvuldig mogelijk uit om deze risico's te voorkomen.

Na het onderzoek

Door het wegnemen van pleuravocht kunt u tijdelijk wat hoesten en/of een drukkend gevoel hebben op de borst. Deze klachten verdwijnen meestal binnen enkele uren.

Als u de eerste 48 uur na het onderzoek klachten krijgen van kortademigheid, hoesten of pijn bij het ademen, neem dan contact op met het ziekenhuis. Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Longziekten. We kunnen dan beoordelen of de klachten te maken hebben met de pleurapunctie.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u bij uw volgende polikliniekbezoek bij uw longarts. Dat is meestal na een week.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust op werkdagen tussen 08.30 -16.30 uur naar de afdeling Longfunctie, tel. (078) 652 33 58. We beantwoorden uw vragen graag. Ook als u verhinderd bent, belt u naar dit telefoonnummer.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

De afbeeldingen in deze folder die gemerkt zijn met een () zijn afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com*

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2019
pavo 1486