

Caudaal injectie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding


De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw pijnklachten worden behandeld met een zogeheten caudaal injectie. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

- U wordt gebeld of u krijgt een brief over de datum van uw behandeling.
- U heeft een afspraak

op : _____ dag _____.

Wat is een caudaal injectie?

Onderaan uw wervelkolom, net boven uw staartbeentje, is een ruimte die de caudale ruimte wordt genoemd. Bij de behandeling worden in deze ruimte medicijnen ingespoten. De medicijnen zorgen ervoor dat uw pijn minder wordt. Het injecteren wordt onder röntgendoorlichting gedaan.



De caudale ruimte net boven het staartbeen

Voor de behandeling wordt u een paar uur opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van locatie Sliedrecht.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereiding

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, is het soms nodig om voor de behandeling tijdelijk te stoppen met deze medicijnen.

De anesthesioloog heeft het volgende met u besproken:

- NSAID`S
- Plavix
- Acenocoumarol
- Marcoumar
- Acetylsalicylzuur /Ascal

-
- dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen.
- Doorgaan met de aangekruiste medicijnen.....

Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, moet u dat vooraf aan uw anesthesioloog vertellen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, raden wij u aan om te bellen met de Pijnpolikliniek. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Dag voor de opname

De dag voor uw behandeling belt een medewerker van het Pijnbehandelcentrum u tussen 11.00 - 13.30 uur. U hoort dan het tijdstip waarop we u verwachten.

Als u op maandag wordt behandeld, bellen we u op vrijdag.

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. U kunt op de dag dat u wordt behandeld het beste iets eten dat licht verteerbaar is. Een lichte maaltijd is bijvoorbeeld brood, crackers of beschuit met zoet beleg en een kopje thee.

Geen bodylotion, nagellak en sieraden

Op de dag van de behandeling mag u geen bodylotion gebruiken. Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, nagellak of make-up dragen. Houd hier thuis al rekening mee.

Vervoer naar huis regelen

Op de dag van uw behandeling mag u zelf niet autorijden. We raden u aan om vervoer naar huis te regelen.

U hoeft geen nachtkleding mee te nemen.

Uw opname

U meldt zich op het afgesproken tijd op de afdeling die met u is afgesproken. Hier wordt het gebied waar u pijn heeft afgetekend. De verpleegkundige brengt u daarna naar de operatiekamer waar de anesthesioloog u behandelt.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op de behandeltafel. Vaak wordt een kussen onder uw buik gelegd om het onderste deel van de wervelkolom goed in beeld te brengen.

De behandeling vindt onder röntgendoorlichting plaats. Hierdoor kan de anesthesioloog heel nauwkeurig de plaats bepalen waar de naald ingebracht wordt. U krijgt eerst een lokale verdoving. Daarna brengt de anesthesioloog een naald in en schuift deze, onder röntgendoorlichting, door naar de caudale ruimte. Hierna spuit de anesthesioloog contrastvloeistof. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt er een combinatie van medicijnen ingespoten (een pijnstillend- en ontstekingsremmend medicijn). De behandeling duurt ongeveer tien minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Als er geen bijzonderheden zijn en als de anesthesioloog het goed vindt, brengt de verpleegkundige u weer naar de afdeling. Als u zich goed voelt kunt u na overleg met de verpleegkundige weer naar huis.

Weer thuis

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Dit kan een paar dagen tot enkele weken duren. U kunt hiervoor een pijnstillert innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat.

Bijwerkingen en complicaties

Het ontstekingsremmende medicijn kan bij vrouwen opvliegers veroorzaken. Verder kan de menstruatie korte tijd worden verstoord. U kunt tijdelijk minder kracht of gevoel hebben in uw benen. Dit komt heel weinig voor. Zolang u minder kracht in uw benen heeft, mag u zelf geen voertuig besturen.

Resultaat van de behandeling

Pas na enkele weken kunnen u en de anesthesioloog beoordelen of de behandeling goed heeft gewerkt. Het is mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft. Soms is een aanvullende behandeling nodig. Deze behandeling kan na verloop van tijd enkele keren worden herhaald.

Bereikbaarheid

Bij vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen naar het Pijnbehandelcentrum tussen 08.15 -12.15 uur en 13.15-15.30.

Let op wij gaan verhuizen. Vanaf 15 juli 2019 is het Pijnbehandelcentrum gevestigd op de locatie Zwijndrecht en verandert het telefoonnummer!

- Tot en met 14 juli 2019 is het telefoonnummer: (0184) 43 42 19.
- Vanaf 15 juli 2019 is het telefoonnummer: (078) 6542219.

Buiten kantoortijden

Buiten deze tijden kunt u in geval van spoed bellen naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

De afbeelding in deze folder is afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Albert Schweitzer ziekenhuis
mei 2019
pavo 1057