

Stellatumblokkade

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld worden met een zogenaamde stellatumblokkade. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Stellatumblokkade

Bij een stellatumblokkade wordt een zenuwknoop in de hals, bij de zevende nekzwervel geblokkeerd. Deze behandeling krijgen mensen met zenuwpijnen in de onderkaak, nek, schouder, borst en arm. Ook mensen met een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) van de arm kunnen deze behandeling krijgen.

De behandeling is gericht op het sensibele (= gevoels) deel van de zenuw en heeft geen invloed op het motorische deel van de zenuw, (= het deel dat de bewegingen aanstuurt).

Voor deze behandeling wordt u een paar uur opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van locatie Sliedrecht.

Afspraak

- Over de datum van de behandeling krijgt u telefonisch of schriftelijk bericht.
- U heeft een afspraak op: _____ dag _____

Vorbereiding

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, is het soms nodig dat u voor de behandeling tijdelijk stopt met deze medicijnen. De anesthesioloog heeft het volgende met u besproken:

- NSAID
- Plavix
- Acenocoumarol
- Marcoumar
- Acetylsalicylzuur/Ascal
-

- _____ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen.

Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, dan moet u dat vooraf aan uw arts vertellen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, raden wij u aan om te bellen naar het Pijnbehandelcentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Belangrijk

Na de behandeling mag u zelf 24 uur geen voertuig besturen. Zorgt u ervoor dat iemand u na uw behandeling naar huis kan brengen.

Dag voor de opname

De dag voor uw behandeling belt een medewerker van het pijnbehandelcentrum u tussen 11.00-13.30 uur. U hoort dan het tijdstip waarop u verwacht wordt.

Als u op maandag wordt behandeld, bellen we u op vrijdag.

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wel raden wij u aan op de dag van de behandeling licht verteerbaar voedsel te nemen.

U hoeft **geen nachtkleding mee** te nemen. U draagt tijdens uw behandeling een operatiejasje.

Geen sieraden en make-up e.d.

Houdt u er rekening mee dat u tijdens de behandeling geen sieraden, piercings, nagellak of make-up mag dragen. Ook mag u op de dag van de behandeling geen bodylotion gebruiken.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De opname

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Dagbehandeling. Op de afdeling trekt u een operatiejasje aan. Hierna brengt de verpleegkundige u naar de operatiekamer.

De behandeling

De behandeling vindt onder röntgendoorlichting plaats. Hierdoor kan de anesthesioloog heel nauwkeurig de plaats bepalen waar de naald ingebracht moet worden.

De anesthesioloog controleert of de naald op de juiste plaats zit, door er lichte stroom op te zetten. Daarna wordt de zenuw met stroom of warmte behandeld. Met deze behandeling wordt de pijngeleiding van de zenuw beïnvloed. Hierdoor wordt de pijn meestal minder.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer) gebracht. Als er geen bijzonderheden zijn en als de anesthesioloog het goedvindt, brengt de verpleegkundige u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Als u zich goed voelt kunt u na overleg met de verpleegkundige weer naar huis.

Bijwerkingen

- Soms kunt u na de behandeling iets wazig zien of uw ooglid kan wat afhangen. Dit komt door de plaatselijke verdoving en verdwijnt binnen een paar uur.
- U kunt een paar dagen het gevoel hebben dat u een brok in de keel heeft.
- Ook kan er een blauwe plek in uw hals ontstaan. Dit komt heel weinig voor.

Complicaties

Er bestaat een kleine kans dat de anesthesioloog tijdens de behandeling het longvlies raakt, waardoor een klaplong (pneumothorax) kan ontstaan.

Napijn

Na de behandeling kunt u napijn hebben, die een paar dagen tot weken kan duren. U kunt hiervoor pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat.

Resultaat van de behandeling

Pas na enkele weken kunnen u en de anesthesioloog beoordelen of de behandeling goed heeft gewerkt. Het is mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Bereikbaarheid

Bij vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen naar het Pijnbehandelcentrum tussen 08.15 -12.15 uur en 13.15-15.30.

Let op wij gaan verhuizen. Vanaf 15 juli 2019 is het Pijnbehandelcentrum gevestigd op de locatie Zwijndrecht en verandert het telefoonnummer!

- Tot en met 14 juli 2019 is het telefoonnummer: (0184) 43 42 19.
- Vanaf 15 juli 2019 is het telefoonnummer: (078) 6542219.

Buiten kantoortijden

Buiten deze tijden kunt u in geval van spoed bellen naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2018
pavo 0464