

Hormoon remmende injecties bij prostaatkanker

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Albert
Schweitzer
ziekenhuis



Inleiding

U heeft zojuist van uw uroloog gehoord dat uit de onderzoeken is gebleken dat u prostaatanker heeft. De arts heeft met u besproken welke gevolgen dat voor u heeft en dat u behandeld gaat worden met hormoon remmende injecties. Een verpleegkundige van het Transmuraal team komt de injecties bij u thuis toedienen.

In deze folder leest u onder andere wat hormoon remmende injecties precies zijn, hoe ze worden toegediend, welke voorbereidingen nodig zijn en met welke bijwerkingen u te maken kunt krijgen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Hormoon remmende injecties

Bij prostaatanker is er sprake van een ongeremde groei (gezwel) van de cellen van de klierbuisjes in de prostaat. De hormoon remmende injecties die u gaat krijgen, moeten er voor zorgen dat het gezwel in uw prostaat kleiner wordt. Daarmee neemt ook de omvang van uw prostaat af en eventuele uitzaaiingen. U merkt dat doordat uw klachten afnemen.

Bij deze behandeling wordt een hormoonpreparaat via een injectie gegeven. Dit preparaat kan een staafje of een oplossing zijn, die in een paar weken geleidelijk oplost en de werkzame stof afgeeft.

Ieder mens heeft het mannelijke geslachtshormoon testosteron in zijn of haar lichaam. Juist testosteron zorgt er voor dat prostaat-kankercellen sneller groeien. De injecties met de hormoonremmende stof zorgen ervoor dat uw lichaam geen testosteron meer aanmaakt. En daardoor zullen de prostaat-kankercellen geremd worden in hun groei.

De voorbereiding

- U krijgt een afspraak bij de verpleegkundige op de polikliniek Urologie. Zij legt u uit hoe de injecties worden toegediend en vertelt u meer over de werking van de injecties. Zij controleert ook of u inmiddels bent aangemeld bij het Transmuraal Team. Met het woord 'Transmuraal' bedoelen we ziekenhuiszorg die buiten het ziekenhuis gegeven wordt, bij deze behandeling dus bij u thuis.
- U heeft van uw uroloog een recept gekregen waarmee u bij uw apotheek tabletten Casodex (bicalatumide) kunt halen voor dertig dagen. U begint meteen met het innemen van deze tabletten.

De tabletten heeft u nodig om u voor te bereiden op de injecties die u gaat krijgen. De tabletten voorkomen namelijk dat de hoeveelheid testosteron stijgt na de eerste injectie. Alleen bij de eerste injectie zal het testosteron stijgen. Bij de volgende injecties die u krijgt, hoeft u deze tabletten dus niet meer in te nemen. Dan zorgen de injecties er juist voor dat uw lichaam geen testosteron meer aanmaakt.

Binnen twee weken nadat u begonnen bent met het innemen van de tabletten, krijgt u uw eerste injectie.

- Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, moet u dit zeggen tegen de verpleegkundige. Het wondje van de injectie kan namelijk door de medicijnen langer nabloeden. U hoeft er niet bang voor te zijn dat u daarmee de hormoon remmende stof verliest.

Het toedienen van de injectie

Het Transmuraal Team gaat u thuis de injectie toedienen. Zij nemen zelf de injectie mee en blijven dat doen zolang u de injecties nodig heeft. Het is belangrijk dat u de injecties regelmatig krijgt toegediend.

- De verpleegkundige vraagt u te gaan zitten of liggen.
- Nadat u uw onderbuik heeft ontbloot, maakt de verpleegkundige de plaats waar de injectie wordt gegeven, schoon met alcohol.
- De verpleegkundige pakt daarna een buikplooï vlak onder uw navel en geeft de injectie met de hormoon remmende stof aan de onderzijde van de buikplooï.
- Daarna plakt zij een pleister op de plaats waar geprikt is.

Vervolgafpraak

Nadat u de injectie heeft gekregen, komt de verpleegkundige van het Transmuraal Team u na 12 of 26 weken weer een injectie geven. Zij neemt dan ook bloed bij u af. Ongeveer een week later heeft u een afspraak bij de uroloog voor de uitslag van het bloedonderzoek.

De uroloog spreekt met u af hoe vaak u de injecties moet krijgen. Soms is het nodig dat u de injecties krijgt voor de rest van uw leven.

Bijwerkingen

U krijgt hormonen toegediend. Er veranderen daardoor tijdelijk dingen in uw lichaam en kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- U kunt last krijgen van ‘opvliegers’.
- U kunt gevoelige borsten krijgen.
- Uw buikvet kan toenemen.
- U kunt minder zin in seks hebben.
- Een erectie kan minder worden of zelfs geheel verdwijnen.

De bijwerkingen gaan meestal over na het stoppen met de injecties. Krijgt u last van andere klachten? Neemt dan contact op met uw uroloog.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Belt u dan gerust tijdens kantooruren naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden. Ook voor het maken of verzetten van een afspraak belt u naar dit nummer.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
mei 2018
pavo 0122