

Aandachtspunten bij gebruik van Strumazol, Carbimazol of PTU

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U heeft een te snel werkende schildklier. Dit wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd. De internist heeft u daarom Strumazol (ook wel Thiamazol genoemd), Carbimazol of propylthiouracil (ook wel PTU genoemd) voorgeschreven. Dit zijn medicijnen die de aanmaak van schildklierhormoon remmen. Hierdoor wordt er minder schildklierhormoon afgegeven in het bloed. In deze folder leest u waarop u moet letten als u deze medicijnen gebruikt.

Bijwerkingen

Koorts

Helaas hebben deze medicijnen ook bijwerkingen. De meest ernstige bijwerking is verstoring van de aanmaak van witte bloedlichaampjes in het beenmerg. Witte bloedlichaampjes zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Bij een tekort aan witte bloedlichaampjes kunnen infecties agressiever verlopen.

Deze bijwerking komt voor bij één op de duizend patiënten die deze medicijnen gebruiken. De bijwerking kan meteen optreden, maar ook pas na langere tijd, bijvoorbeeld een jaar. Dus zolang u deze medicijnen gebruikt, kan dit optreden! Het is niet zinvol om regelmatig uw bloed te controleren, omdat een normale waarde geen garantie geeft voor de toekomst.

Als u koorts (temperatuur boven 38,5°C) heeft of koorts met andere klachten zoals keelpijn, of benauwdheid dan stopt u gelijk met het gebruik van Strumazol, Carbimazol of PTU. U belt gelijk met de internist, de dienstdoend internist of huisarts.

Deze kan ervoor zorgen dat op dezelfde dag, liefst binnen enkele uren, uw bloed onderzocht wordt. Overhandigt u altijd deze folder als u een arts bezoekt die niet uw behandelend arts is.

Zo nodig kan er antibiotica worden gegeven. Soms moet u helemaal stoppen met de Strumazol, Carbimazol of PTU. Daarmee kan de aanmaak van witte bloedcellen meestal weer volledig herstellen.

Huiduitslag

Een andere bijwerking is jeukende huiduitslag. Ook dan stopt u met dit medicijn en belt u met de internist voor overleg. Zodra de huiduitslag en jeuk verdwenen is kunt u met nieuwe medicijnen starten voor uw schildklierandoening.

Bereikbaarheid

Op werkdagen tussen 08.00 -17.00 uur kunt u bellen naar de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) 654 64 64.

Buiten kantooruren kunt u als u in de regio Drechtsteden woont, bellen met huisartsenpost, tel. (078) 20 200 20. Als u niet in de regio Drechtsteden woont belt u met de huisartsenpost in uw regio.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
november 2017
pavo 1105