

# Iloprost (Ilomedine ®)

Voorgeschreven door de  
reumatoloog

# informatie

Albert Schweitzer ziekenhuis  
januari 2014  
pavo 0903



## Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u iloprost gaat gebruiken. In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaconsulent. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaconsulent bespreken.

## Werking van iloprost

Iloprost wordt voorgeschreven bij vaatvernauwende aandoeningen zoals bij het fenomeen van Raynaud en vasculitis.

Iloprost is een vaatverwijdend medicijn. Dit medicijn maakt het bloed ook minder stroperig. Hierdoor verbetert de bloeddoorstroming. Dit kan ervoor zorgen dat wondjes bijvoorbeeld aan de vingers sneller genezen.

Het effect van de behandeling kan snel optreden en kan enkele weken (soms maanden) aanhouden.

## Het gebruik van iloprost

Iloprost wordt via een infuus gegeven. U krijgt meestal 3-5 dagen achter elkaar ieder dag een infuus. Ieder infuus duurt ongeveer zes uur. De reumatoloog bespreekt met u of u na elk infuus naar huis kunt gaan of gedurende de hele behandeling in het ziekenhuis opgenomen blijft.

De voorgeschreven dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht en wordt gegeven volgens een zogenaamd opbouwschema. Dit betekent dat de snelheid waarmee het infuus inloopt langzaam wordt opgehoogd.

# informatie

## Bijwerkingen

U kunt tijdens het infuus last krijgen van bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Hoofdpijn.
- Maagdarmklachten zoals misselijkheid en braken .
- Het warm krijgen en transpireren.
- Bloeddrukverandering.
- Pijn in de kaak.
- Pijn in het aangedane lichaamsdeel.

## Controle

Tijdens het infuus controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en hartslag.

De toedieningsnelheid van het infuus is afhankelijk van bovenstaande controles en van hoe u zich voelt (of u bijvoorbeeld last van hoofdpijn of misselijkheid heeft).

## Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Iloprost heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid. Iloprost mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Tijdens de behandeling wordt het geven van borstvoeding ontraden.

## Vaccinaties

Dit medicijn heeft geen invloed op de griepvaccinatie (grieprik) en alle andere vaccinaties.

# informatie

## Gebruik van iloprost samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts over uw behandeling met iloprost.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

## Alcohol

Door het gebruik van alcohol kunt u meer last van bijwerkingen krijgen. Daarom wordt het gebruik van alcohol op de dagen dat u het infuus krijgt afgeraden.

## Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 08.00-16.00 uur bellen met de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35.

U kunt ook bellen met de reumaconsulenten, tel. (078) 654 24 38, (078) 654 29 89 of (078) 654 26 78.

Meer informatie over medicijnen kunt u vinden op de website van het College voor Zorgverzekeringen: [www.fk.cvz.nl](http://www.fk.cvz.nl) en op [www.apotheek.nl](http://www.apotheek.nl)

# informatie