

Tetracaïne-HCL

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is Tetracaïne-HCL?

Tetracaïne-HCL is een plaatselijk verdovingsmiddel. Het wordt vaak gebruikt bij oogartsen en KNO-artsen om de huid of slijmvliezen te verdoven.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Tetracaïne-HCL. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk om contact met Tetracaïne-HCL zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Deze stof komt voor in verdovingsmiddelen om de huid of slijmvliezen te verdoven.

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen in de ingrediëntenlijst:

- 2-(Dimethylamino)ethyl p-(butylamino)benzoate.
- 2-dimethylaminoethyl 4-n-butylaminobenzoate hydrochloride.
- 2-Dimethylaminoethylester kyseliny p-butylaminobenzoove.
- 4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride.
- 4-14-00-01172 (Beilstein Handbook Reference).
- Amethocaine hydrochloride.

- Amethocaïne.
- Anetain.
- Anethaine
- Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethylester.
- BRN 2216051.
- Butethanol.
- Contralgin.
- Curtacain.
- Decicain.
- Diaethylaminoethanol ester der pbutylaminobenzoësaeure.
- Dicain.
- Dicaïne.
- Dikain.
- Dimethylaminoethyl p-butyl aminobenzoate.
- EINECS 202-316-6.
- Fissucain.
- Gingicain M.
- Intercain.
- Laudocaïne.
- Medicaïne.
- Medihaler-Tetracaïne.
- Meethobalm.
- Menonasal.
- Metraspray.
- Mucaesthin.
- Niphanoid.
- p-(Butylamino)benzoic acid, 2-(dimethylamino)ethylester.
- Pantocaïne.
- p-butylaminobenzoyl-2-dimethylaminoethanol hydrochloride.
- p-Butylaminobenzoyl-2-dimethylaminoethanol.
- Pontocaine hydrochloride.
- Pontocaïne.
- Rexocaïne.

- Tetracaïne.
- Tetracaïne hydrochloride.
- Tetracaïne.
- Tetracainum.
- Tetrakain.
- Tonexol.
- Uromucaesthin.

Kruisreacties

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor Tetracaïne-HCL. Dan reageert uw lichaam alsof u met Tetracaïne-HCL in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Dit kan gebeuren bij Lidocaïne en andere middelen die eindigen op –caïne en bij Butethamine, PABA, parabenen en andere stoffen die behoren tot de zogeheten para-groep verbindingen.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2026
pavo 2126