

# Stoppen met medicijnen voor een allergientest

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**

# Inleiding

U krijgt binnenkort een allergenetest. Hiervoor is het nodig dat u stopt met de medicijnen die hierna worden genoemd. Meer informatie over de test leest u in de folder 'Longfunctieonderzoeken'.

- **72 uur vóór de test**

U stopt met het innemen van antihistamine tabletten (tegen allergie of andere aandoeningen, onder andere ook reistabletten).

- Aerius (Desloratadine)
- Allerfre (Loratadine)
- Atarax (Hydroxizine)
- Cinnipirine (Cinnarizine)
- Claritine (Loratadine)
- Cyclizine (Cyclizine)
- Dramamine (Dimenhydrinaat)
- Emesafene (Meclozine/Pyridoxine)
- Hydroxyzine (Hydroxyzine)
- Kestine (Ebastine)
- Ketotifen (Ketotifen)
- Mebhydroline (Mebhydroline)
- Mizollen (Mizolastine)
- Phenergan (Promethazine)
- Polaramine (Dexchlooreniramine)
- Promethazine (Promethazine)
- Ranitidine (Zantac)
- Rupafin (Rupatadine)
- Semprex (Acrivastine)
- Suprimal (Meclozine)
- Tavegil (Clemastine)
- Telfast (Fexofenadine)
- Tinset (Oxatomide)
- Triludan (Terfenadine)
- Xyzal (Levocetirizine)
- Zyrtec (Cetirizine)
- Andere antihistamine tabletten (tegen allergie)

- **Op de dag van de test**

U smeert op de dag van de test *geen corticosteroïde zalf op uw onderarmen.*

**U hoeft niet te stoppen met neussprays en andere medicijnen!**

Twijfelt u over een medicijn? Bel dan gerust voor overleg naar de afdeling Longfunctie, tel. (078) 652 33 28. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

Albert Schweitzer ziekenhuis  
februari 2023  
pavo 1744