

Nazorg angiografie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

In deze folder leest u meer over de adviezen na een angiografie. Een angiografie is een onderzoek en dus geen behandeling voor uw klachten.

Tijdens het onderzoek is de liesslagader aangeprikt. Hoewel de kans klein is, kan er soms een nabloeding ontstaan. Om dit te voorkomen geven wij u enkele adviezen.

De dag van het onderzoek

Na het onderzoek heeft u drie uur bedrust. U heeft een pleister op de plaats waar de ader is aangeprikt. Soms krijgt u een drukverband om uw lies.

Probeer de dag dat u uit het ziekenhuis ontslagen bent, het been aan de aangeprikte zijde zoveel mogelijk te ontlasten. Dit betekent het been zoveel mogelijk gestrekt houden, niet lang lopen of staan, het traplopen beperken en niet fietsen of autorijden. Loopt u de trap op, doet dit dan rustig aan, trede voor trede.

Medicijnen

Als u de bloedverdünnende medicijnen Sintrommitis (acencoumarol) of Marcoumar (fenprocoumon) gebruikt en u bent hiermee enkele dagen voor de behandeling gestopt, moet u deze medicijnen weer gaan innemen in overleg met de Trombosedienst.

Als u een NOAC gebruikt en u bent hiermee enkele dagen gestopt, moet u deze medicijnen weer gaan innemen in overleg met de arts. Onder de NOAC's vallen de volgende medicijnen: Apixaban (Eliquis), Dabigatran (Pradaxa), Rivaroxaban (Xarelto) en Edoxaban (Lixiana).

De eerste twee dagen na het onderzoek

De ochtend na het onderzoek kunt u de pleister of het eventuele drukverband zelf verwijderen. Daarna kunt u gewoon weer douchen. Ga de eerste dagen liever niet in bad.

Als er een paar druppels bloed lekken uit de aangeprikte plek kunt u dit verbinden met een gaasje of er een pleister opplakken.

Verder adviseren wij u de lies niet te veel te belasten. Vermijd het tillen van zware dingen (max. 5 kg) en het maken van veel bewegingen (bijvoorbeeld fietsen, auto besturen, traplopen, stofzuigen, ramen zemen).

Probeer tijdens niezen, hoesten of persen niet teveel druk op de wond te zetten. Als u toch moet niezen, hoesten of persen geef tegendruk met uw hand op de lies.

De dagelijkse activiteiten die u deed voor onderzoek kunt u vanaf de derde dag na de angiografie weer doen. Ga pas na een week weer sporten en zwaar lichamelijke arbeid doen.

De dag na de behandeling wordt u door een verpleegkundige van afdeling D2D gebeld. De verpleegkundige vraagt of er nog problemen met de lies zijn ontstaan. Soms lukt het de verpleegkundige niet om u te bellen, bel dan zelf naar de afdeling bij vragen en/of bijzonderheden.

Soms kan het nodig zijn dat u voor controle van de lies naar het ziekenhuis komt. Mocht u zelf nog vragen hebben dan kunt u die aan de verpleegkundige stellen.

Afspraak bij de arts

Als u nog geen afspraak heeft bij uw behandelend arts, maakt de verpleegkundige voor u de afspraak. De afspraak is ongeveer twee weken na het onderzoek.

Een arts waarschuwen

De lies kan wat dik en blauw zijn. Het is ook mogelijk dat er een paar druppels bloed lekken uit de plek waar u geprikt bent. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken.

Bel in de volgende situaties wel direct met uw behandelend specialist, afdeling Spoedeisende Hulp of in uiterste nood: alarmnummer 112.

- Als het wondje in uw lies hevig gaat bloeden. Dit kan namelijk duiden op een slagaderlijke bloeding. Raak niet in paniek, maar druk met uw vingers of vuist de slagader dicht 1-2 cm boven de plaats waar het bloedt, of laat dit door iemand anders doen.
- Als er een plotselinge toenemende zwelling in de lies ontstaat. Druk tot er hulp komt stevig met een vuist op de ontstane bobbel, of laat dit door iemand anders doen.
- Krijgt u plotseling last van (krampende) pijn, gevoelloosheid of koud aanvoelen van uw been dan kan dit duiden op een afsluiting van een bloedvat.
- Bij andere verschijnselen zoals: koorts (38 °C en hoger), gevoelloosheid, pijn, huiduitslag, rode verkleuring of een warm gevoel van de lies.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tussen 08.00 -16.00 uur bellen met afdeling D2D, tel.(078) 654 64 12.

Belangrijke telefoonnummers

- Afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (078) 652 32 10.
Als u niet in Dordrecht en omgeving woont kunt u bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis bij u in de buurt.
- Alarmnummer, tel. 112.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
november 2020
pavo 0482