

Reslizumab

Medicijn bij eosinofiel astma

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Uw longarts heeft u het medicijn reslizumab voorgeschreven. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van ernstig eosinofiel astma. Behandeling met reslizumab kan worden voorgeschreven als u ondanks een hoge dosering ontstekingsremmers en luchtwegverwijders, nog steeds veel klachten heeft.

In deze folder leggen we u het doel en de werking van het medicijn uit. Daarnaast zetten we een aantal praktische zaken op een rij rond de behandeling met reslizumab, zoals de proefperiode, het thuis injecteren en het herkennen van allergische reacties.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Wat is reslizumab?

Het doel van de behandeling met reslizumab is om de klachten van uw eosinofiel astma beter onder controle te krijgen. Om te begrijpen waarom de reslizumab deze verbetering kan geven, volgt hier een korte uitleg over het medicijn.

Bij astma is er sprake van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Bij deze ontstekingsreactie zijn er verschillende soorten ontstekingscellen (witte bloedcellen) betrokken, waaronder zogeheten eosinofielen.

Eosinofiel astma is een vorm van astma die niet goed reageert op gebruikelijke puffers. Dat komt doordat er te veel eosinofielen in de luchtwegen zitten.

Reslizumab is een medicijn dat er juist voor zorgt dat de eosinofielen worden geremd, waardoor uw astmaklachten kunnen verminderen.

Hoe wordt reslizumab gegeven?

Reslizumab wordt iedere 4 weken gegeven. U krijgt de reslizumab via een infuus. Dat betekent dat u het medicijn via de bloedbaan krijgt toegediend. U komt daarvoor naar het ziekenhuis.

Bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook reslizumab bijwerkingen veroorzaken.

- De meest, maar niet vaak, voorkomende bijwerking is spierpijn. Als u wilt kunt u hiervoor paracetamol innemen.
- Daarnaast kan iemand allergisch reageren op het medicijn reslizumab. Hoewel dit zelden voorkomt, is dit de reden dat u bij de eerste drie behandelingen 2 uur na het toedienen van de medicijnen op de afdeling Dagbehandeling moet blijven. In deze tijd controleren we regelmatig uw bloeddruk. Zo kunnen we goed in de gaten houden of u allergisch reageert.

Start behandeling

Dagbehandeling

Het medicijn reslizumab wordt iedere 4 weken via een infuus gegeven op de afdeling Dagbehandeling, locatie Zwijndrecht.

Daarvoor wordt u 2 - 3 uur opgenomen. Voor deze opnames krijgt u afspraken mee. De afspraken maken we in overleg met u.

De dosering van de reslizumab wordt bepaald op basis van uw gewicht. Daarom wordt u bij iedere opname op de afdeling Dagbehandeling gewogen.

Er zijn geen voorbereidingen nodig voor deze behandeling. Ook na de behandeling hoeft u nergens rekening mee te houden en mag u autorijden.

Om het effect van de behandeling te meten, vragen we u bij iedere opname een vragenlijst over uw astmaklachten in te vullen.

Voortzetten behandeling

Na een proefperiode van 3 maanden heeft u een afspraak met de longarts of verpleegkundig specialist om te bespreken of het medicijn helpt. Dan wordt in overleg besloten of u met de behandeling doorgaat of niet.

Als de behandeling met reslizumab goed effect heeft, gaat u het medicijn voor lange tijd gebruiken. Voor de geven van de reslizumab blijven we afspraken maken op de afdeling Dagbehandeling, locatie Zwijndrecht. Bij het voortzetten van de behandeling hoeft u na het toedienen van de reslizumab niet meer die 2 uur te blijven op de afdeling; u mag dan direct naar huis.

Controles

Als u doorgaat met de behandeling, komt u elke 3 maanden bij de verpleegkundig specialist of longarts voor (telefonische) controle. Minimaal één keer per jaar krijgt u een afspraak bij de longarts. Zo nodig overlegt de verpleegkundig specialist met uw longarts.

Neem steeds weer deze vragen door

Voordat u het infuus met reslizumab krijgt, moet u elke keer weer eerst onderstaande vragen doornemen:

- Heb ik de afgelopen week een vaccinatie gehad?
- Heb ik de afgelopen week koorts gehad?
- Heb ik de afgelopen week last van diarree en braken gehad?
- Heb ik de afgelopen week mijn huisarts bezocht? Zo ja, waarom.
- Zijn mijn benauwdheidsklachten afgelopen week sterk verergerd?
- Heb ik na het vorige infuus klachten gehad? Zo ja, welke klachten en hoe erg waren ze?

Als u een van deze vragen met ja beantwoordt, bel dan eerst voor overleg naar de verpleegkundig specialist of de polikliniek Longgeneeskunde. Dan hoort u van haar of u de afspraak voor het infuus met reslizumab die dag door kan gaan.

Voor vrouwen: wilt u zwanger worden of bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dat altijd door aan de verpleegkundig specialist.

Herken ernstige allergische reacties

Het is goed om te weten wat de voortekenen kunnen zijn van een ernstige allergische reactie. Wanneer u één van de volgende symptomen krijgt, dan is dat meestal een milde allergische reactie.

Krijgt u *meerdere* ernstige klachten van de volgende symptomen, **bel dan direct:**

- Maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de verpleegkundig specialist of de polikliniek Longgeneeskunde,
- tel. (078) 652 33 28. Ook als u twijfelt, belt u.
- Heeft u dringend hulp nodig buiten deze tijden? Bel dan naar afdeling C1, tel. (078) 652 34 54.

Symptomen van de huid

- Jeuk
- Roodheid van de huid
- Galbulten
- Zwelling

Symptomen van de luchtwegen

- Jeuk/zwelling van de lippen, tong of keel
- Moeite met slikken
- Moeite met ademen
- Kortademigheid
- Druk op de borst
- Piepende ademhaling

Andere symptomen

- Misselijkheid
- Duizeligheid
- Flauwvallen

Belangrijk

- Verandert er iets in de andere medicijnen die u gebruikt, geef dit altijd door aan de verpleegkundig specialist.
- Als u onverhoopt uw infuus reslizumab heeft gemist, is het *belangrijk zo snel mogelijk te bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde*. We maken dan een nieuwe afspraak.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Longgeneeskunde, tel. (078) 652 33 28.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2020
pavo 1614