

# Borstvoeding geven met een tepelhoedje

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

## informatie

# Inleiding

Een tepelhoedje is een (tijdelijk) hulpmiddel bij het geven van borstvoeding. Het is een siliconen opzetstuk met tepelvorm dat over uw tepel en de tepelhof geplaatst wordt.

Een tepelhoed kan worden gebruikt als uw baby problemen heeft met goed 'aanhappen' aan de borst of het vasthouden van de borst (vacuüm).



# Wanneer kan een tepelhoedje gebruikt worden?

- Bij vroeggeboorte. Sommige baby's die te vroeg geboren zijn, kunnen moeite hebben om goed diep aan de tepel te zuigen en daarmee het vacuüm vast te houden.
- Bij vlakke en/of ingetrokken tepels.
- Bij ernstige stuwung. De borst is dan te hard om goed aan te kunnen happen. De baby zou dan tijdelijk kunnen drinken met een tepelhoedje.
- Bij baby's met een aangeboren afwijking. Zij kunnen moeite hebben met het vacuüm te behouden.
- Bij baby's die de fles gewend zijn. Met een tepelhoedje kunnen ze wennen om uit de borst te drinken.

## Het gebruik van een tepelhoedje

Er zijn drie verschillende maten tepelhoedjes: S, M en L. Bij het kiezen wordt vooral gekeken naar de grootte van uw tepel en de grootte van de mond van uw baby.

Let erop dat de uitsparing van het tepelhoedje op de plek zit waar de neus van de baby zit tijdens de borstvoeding. Uw baby blijft dan in contact met de geur van u en uw baby heeft huidcontact.

- Kies de juiste maat, of laat u voorlichten door de verpleegkundige of lactatiekundige over de juiste maat.
- Buig de zijanten van het tepelhoedje naar buiten.
- Klap het hoedje binnenste buiten.
- Zet het hoedje op uw tepel en laat de zijanten op uw borst komen.

- Zorg ervoor dat uw tepel precies in het midden van de uitsparing zit.

U kunt de randen van het tepelhoedje vooraf een beetje vochtig maken met water zodat het beter blijft zitten.

## Hoe leg ik mijn baby aan mijn borst?

Als u een tepelhoedje gebruikt, gaat het aanleggen van uw baby op dezelfde manier als het aanleggen aan de borst zonder tepelhoedje. Ook bij het aanleggen met een tepelhoedje is het belangrijk dat uw baby een grote hap neemt en het tepelhoedje in de mond neemt tot aan het brede gedeelte. De kin van uw baby ligt tijdens het voeden in de borst, de neus is vrij. De lippen zijn naar buiten gekruld.

Let erop dat de baby het tepelhoedje niet tussen de kaken platdrukt of vervormt. Corrigeer eventueel door op de kin te drukken en zo de mond wijder open te maken.

## Na het voeden

Spoel de tepelhoed na gebruik goed af; eerst met koud water, daarna met heet water. Droog het tepelhoedje af. Bewaar het tepelhoedje in een afgesloten bakje of afsluitbaar zakje. Kook het tepelhoedje één keer per dag uit, gedurende vijf minuten.

### Kolven

Het is belangrijk om, na het voeden met een tepelhoedje, de borsten te controleren of deze goed zijn leeggedronken. Goed leeggedronken wil zeggen dat er geen harde schijven meer in uw borst voelbaar zijn. Als uw baby met een tepelhoedje drinkt, kan het zijn dat de borsten minder goed worden leeg gedronken.

Als de borstvoeding nog op gang moet komen is het altijd nodig om na het voeden met een tepelhoedje beide borsten te kolven. Als u nog harde plekken in uw borst voelt, is het belangrijk om beide borsten nog even te kolven tot ze soepel zijn. De melkproductie blijft zo beter op gang.

## Nadelen van een tepelhoedje

Een tepelhoedje kan u helpen bij de borstvoeding. Maar er kunnen ook nadelen zijn:

- Het tepelhoedje kan het toeschieten van de melk vertragen. Soms vermindert daardoor de melkproductie.
- Met het tepelhoedje kan uw baby minder goed met zijn tong de melk uit de borst masseren en wordt de tepelhof minder geprikkeld.
- Er kan gewenning ontstaan waardoor het niet meer lukt uw baby rechtstreeks uit de borst te laten drinken.
- Uw baby leert met tepelhoedje een andere drinktechniek dan zonder tepelhoedje.

Door dit alles kan het gebeuren dat uw baby de borst minder goed leeg drinkt en de productie van de melk afneemt. Hierdoor kan uw baby minder snel groeien. Let dus op dat uw baby voldoende drinkt. Kolf beide borsten als uw baby minder drinkt.

# Afwennen

Een tepelhoedje blijft een tijdelijk hulpmiddel. U gaat dit pas afwennen als het voeden goed gaat en uw baby goed groeit. Het afwennen van een tepelhoedje gaat makkelijker als:

- Er veel huid-op-huid contact met uw baby is. Dit stimuleert de voedingsreflexen bij uw baby waardoor aanleggen makkelijker gaat.
- U eerst begint met het tepelhoedje. Na enkele minuten onderbreekt u het voeden en haalt u het tepelhoedje weg. Leg uw baby opnieuw aan zonder tepelhoedje. Lukt het niet leg dan weer aan met tepelhoedje en blijf dit van tijd tot tijd proberen.

**Voedt u met een tepelhoedje en lukt het niet om af te wennen?  
Dan geldt: liever voeden mét tepelhoed dan geen borstvoeding.**

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

# **Persoonlijke aanvullende informatie**

Albert Schweitzer ziekenhuis  
september 2021  
pavo 1139