

# Blaasspoelingen met BCG

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**



# Inleiding

U start binnenkort met blaasspoelingen met BCG. Blaasspoelingen worden gedaan om de kans op terugkeer van gezwellen in de blaas te verkleinen. Er zijn vele soorten blaasspoelingen. De uroloog heeft met u besproken dat uw blaas gespoeld gaat worden met BCG. De afkorting BCG staat voor Bacillus Calmette-Guérin. Dit is een middel dat het ongecontroleerd groeien van lichaamscellen remt.

In deze folder leest u welke voorbereidingen nodig zijn, hoe de spoeling verloopt en waar u na de spoeling rekening mee moet houden.

## **Schema spoeling**

U gaat een aantal BCG-spoelingen krijgen. De secretaresse maakt voor u de afspraken. Deze krijgt u van haar mee of opgestuurd. Bij de eerste spoeling krijgt u verdere uitleg over de spoelingen. De eerste zes weken krijgt u iedere week een spoeling. Daarna wordt regelmatig een cystoscopie (kijkonderzoek in de blaas) gedaan. De uitslag van iedere cystoscopie bepaalt of u nog meer spoelingen nodig heeft. Deze controle-afspraken worden gedurende één of meerdere jaren gedaan.

## **Beleving**

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

# De voorbereiding

## Urineweginfectie?

Heeft u de dag voor de blaasspoeling een urineweginfectie? Of denkt u die te hebben? Bel dan naar de polikliniek Urologie. Zij zullen u vragen om een potje met urine naar de polikliniek te brengen. Als u een urineweginfectie heeft, dan kan de blaasspoeling misschien niet doorgaan.

## Drinken

Op de dag van de blaasspoeling mag u niet teveel drinken. U moet de spoelvlloeistof namelijk 1 tot 2 uur in uw blaas vasthouden. Als u minder drinkt, hoeft u ook minder te plassen.

Drink ook niet te weinig, zeker als het buiten warm is. Anders kunt u uitdrogen en krijgt u makkelijker een blaasontsteking.

## Plassen

De spoeling wordt uitgevoerd in het ziekenhuis op de polikliniek Urologie. Voorafgaand aan de spoeling vraagt de verpleegkundige u om uit te plassen. De verpleegkundige brengt u naar de spoelkamer en vraagt u de kleding van uw onderlichaam te laten zakken.

## De spoeling

U gaat om liggen op de behandeltafel. De behandeling wordt gedaan door een verpleegkundige, doktersassistente, verpleegkundig specialist of een arts-assistent.

De ingang van uw plasbuis wordt schoongemaakt met een nat gaasje.

Daarna wordt een dun slangetje in uw blaas ingebracht. Dit heet een katheter. Het inbrengen van het slangetje kan gevoelig zijn. De achtergebleven urine in uw blaas loopt via de katheter weg.

Vervolgens wordt de spoeling aangesloten op de katheter. De spoelvoeistof loopt rustig in uw blaas. Het is een kleine hoeveelheid van 50 ml. Als de spoelvoeistof in uw blaas is gelopen, wordt de katheter met 10 ml zout water nagespoeld. Hierna wordt de katheter verwijderd.

Uw onderlichaam wordt gewassen en u krijgt een verbandje. Hierna kunt u naar huis.

U probeert na de spoeling de spoelvoeistof 1 tot maximaal 2 uur in uw blaas te houden. Daarna kunt u uitlaten.

## Nazorg

BCG is een middel dat de celgroei remt. Het is niet goed als anderen met dit middel in aanraking komen. Daarom moet u een paar voorzorgsmaatregelen nemen:

- Wij adviseren u zittend te plassen.
- Na het plassen moet u uw onderlichaam goed wassen met water. Uw handen wast u met water en zeep.
- Het toilet spoelt u twee keer door met gesloten deksel.
- De eerste 24 uur na de spoeling moet u elke keer als u naar de wc bent geweest, de wc-pot en -bril en het deksel met chloor schoon maken.
- Ga goed drinken (de verpleegkundige vertelt u hoeveel), zodra u de eerste keer na de spoeling heeft geplast.

# Bijwerkingen

Een spoeling met BCG kan een aantal bijwerkingen hebben:

- Kort na de spoeling kunt u vaker het gevoel hebben dat u moet plassen.
- Kort na de spoeling kunt u een branderig gevoel hebben bij het plassen.
- De eerste keren na de spoeling kan er wat bloed bij de urine zitten.
- De dag na de spoeling kunt u zich wat griepig voelen (koorts, spierpijn, niet lekker). Als u langer dan twaalf uur meer dan 38,5°C koorts heeft, bel dan de polikliniek Urologie.
- BCG kan ook later nog een reactie in uw lichaam geven. Als u later last krijgt van koorts en/of gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak, bel dan uw huisarts. Geef aan dat u in het verleden BCG-spoelingen heeft gehad.

## Advies

Het is niet precies bekend hoe lang eventuele resten van de BCG-spoeling achterblijven in uw blaas. Wij raden aan om in de week na de blaasspoeling een condoom te gebruiken bij alle seksuele handelingen en geen orale seks te hebben.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag.

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Urologie belt u op genoemde tijden naar tel. (078) 652 32 80.  
Als u buiten de genoemde tijden problemen krijgt, belt u naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

Albert Schweitzer ziekenhuis  
februari 2025  
pavo 0116