

Chemische lumbale sympathectomie (CLS)

Behandeling van de zenuwstreng aan de voorzijde van de wervelkolom

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een chemische lumbale sympathectomie. In deze folder leest u hier meer over.

Chemische lumbale sympathectomie

Bij een CLS behandeling wordt de zenuwbaan die aan de voorzijde van de wervelkolom loopt, geblokkeerd. Deze behandeling wordt geadviseerd bij patiënten met pijn aan de wervelkolom en/of been (bijvoorbeeld CRPS), bij doorbloedingsstoornissen of bij bepaalde zenuwpijnen. De behandeling is gericht op het sensibele (gevoels)deel en heeft geen invloed op het motorische deel van de zenuw (het deel dat de beweging aanstuurt).

Vorbereiding

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wel raden wij u aan op de dag van de behandeling licht verteerbaar voedsel te nemen. **Neem wel uw medicijnen in.** Als u bloedverdunners gebruikt dan heeft uw behandelaar hierover aparte afspraken met u gemaakt.

Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, moet u dat vooraf aan uw pijnspecialist te vertellen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, kan deze behandeling niet plaatsvinden vanwege de röntgenstralen.

Vervoer naar huis regelen

Op de dag van uw behandeling mag u zelf niet autorijden. We raden u aan om vervoer naar huis te regelen.

Geen sieraden en make-up etc.

Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, piercings, nagellak of make-up mag dragen. Ook mag u op de dag van de behandeling geen bodylotion gebruiken.

Wilt u ervoor zorgen als u gelnagels draagt dat er op één nagel van uw hand of voet geen gelnagel zit? Het meten van het zuurstofgehalte in het bloed is namelijk niet mogelijk bij gelnagels.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Uw opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier krijgt u een operatiejasje aan en wordt uw pijnkant afgetekend.

Daarna wordt u naar de operatie-afdeling gebracht. Daar wordt een infuusnaaldje in uw arm gebracht. Via dit infuusnaaldje kan tijdens de behandeling medicatie gegeven worden.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u voorover op de behandeltafel met een kussen onder uw buik. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling stil ligt.

De arts geeft een plaatselijke verdoving in de huid op de plaats waar de naald ingebracht gaat worden. Daarna wordt de naald, onder röntgendoorlichting naar de voorkant van uw wervelkolom geschoven. Als de naald in de goede positie staat wordt er een kleine hoeveelheid chemische vloeistof ingespoten. Het inspuiten kan gevoelig zijn. De arts controleert op röntgenbeeld het verloop van de behandeling.

Als de behandeling klaar is, wordt de naald verwijderd en wordt het gaatje afgeplakt met een pleister.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Als er geen bijzonderheden zijn en als de pijnspecialist het goed vindt, brengt de verpleegkundige u weer naar de afdeling. Als u zich goed voelt, kunt u na overleg met de verpleegkundige weer naar huis. Dit is meestal na ongeveer 1 uur.

Weer thuis

De eerste dagen na de behandeling kunt u napijn hebben of spierpijn in uw rug. Dit is normaal en gaat vanzelf weer over. Voor uw napijn kunt u paracetamol gebruiken.

Een arts waarschuwen

U belt een arts als u last krijgt van::

- Koorts: oplopende temperatuur boven de 38°C.
- Infectie: roodheid, pus, pijn, warme huid bij de insteekopening van de naald in de rug.
- Toename van de pijn.
- Onbegrepen klachten.

Van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur belt u het Pijnbehandelcentrum, tel. (078) 654 22 19.

's Avonds en in het weekend belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (078) 652 32 10.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur bellen naar het Pijnbehandelcentrum, tel. (078) 654 22 19.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
december 2020
pavo 1016