

Opname van uw baby

Bij gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U gebruikt tijdens de zwangerschap bepaalde antidepressiva. Dit wordt SSRI-medicatie genoemd. Uw baby krijgt via de navelstreng ook een deel van deze medicijnen binnen. Na de bevalling krijgt uw baby deze medicijnen niet meer. Hierdoor kan uw baby ontregeld raken. Uw baby wordt, als hij geboren is onder de 37 weken, direct na de bevalling voor minimaal 24 uur opgenomen op de afdeling Neonatologie of de Kinderafdeling. Er kan dan gekeken worden welke invloed de medicijnen op uw baby hebben. De meeste verschijnselen gaan na enkele dagen vanzelf over.

De arts beoordeelt na 24 uur de conditie van uw baby. Afhankelijk daarvan wordt besloten of hij, voor nog minimaal 24 uur, naar u op uw kamer bij Rhena mag.

In deze folder leest u meer over de meest voorkomende bijwerkingen die uw baby kan krijgen en wat u kunt verwachten. Deze kunnen bij iedere baby anders zijn. Het is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort medicijn dat u gebruikt.

We spreken in deze folder over uw baby als 'hij,' maar hier kan natuurlijk ook 'zij' gelezen worden.

Ademhaling

Door uitwerking van de medicijnen kan uw baby ademhalingsproblemen krijgen. Uw baby kan te oppervlakkig ademen, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed zakt. Daarbij kan de hartslag ook zakken.

Daarom controleren we de hartslag en ademhaling en zuurstofgehalte van uw baby in de eerste 24 uur via een monitor (monitorbewaking). De kans op ademhalingsproblemen is in de eerste 24 uur na de geboorte het grootst.

Afhankelijk van de hoeveelheid en diepte van de dalingen beslist de arts of uw baby langer opgenomen moet blijven. De monitorbewaking wordt dan voortgezet.

Voedingsproblemen

Een veelvoorkomende bijwerking zijn voedingsproblemen zoals slecht drinken of spugen. Het spugen kan bij iedere voeding, maar ook tussen de voedingen door en kan een aantal maanden aanhouden. Dit hoeft geen probleem te zijn om goed te blijven drinken aan de borst of uit de fles.

De groei van uw baby wordt in de gaten gehouden tijdens de controle op de polikliniek.

Als tijdens de opname blijkt dat uw baby bijna geen voeding binnen kan houden of heel slecht drinkt kan het noodzakelijk zijn om langer opgenomen te blijven.

Houding en slaapproblemen

Uw baby kan geprikkeld reageren op dingen om hem heen. Veel voorkomend zijn onrust, huilen, trillerig zijn en 'wapperen' met armen en benen. Ook een verhoogde spierspanning en slaapproblemen komen regelmatig voor.

Adviezen:

- Probeer de omgeving rustig te houden en te kijken wat hij kan hebben aan prikkels.

- Tijdens de verzorging kunt u uw baby 'begrenzen'. Wikkel uw baby bijvoorbeeld in een omslagdoek als hij uit bed is. U kunt de armen van uw baby met uw hand of met een doek ondersteunen tijdens het verzorgen. Dit voorkomt 'wapperen' met armen en benen. Het geeft uw baby rust en kan zich dan beter ontspannen.
- Probeer de voeding in een rustige, prikkelarme omgeving te geven.

Naar Rhena

Zodra uw baby bij u op de kamer mag wordt de monitorbewaking gestopt. De observaties gaan, bij Rhena, door gedurende de volgende 24 uur.

Voor ontslag wordt uw baby nagekeken door de kinderarts.

U krijgt een afspraak mee voor een poliklinische nacontrole bij de kinderarts.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen?

Stel of bespreek deze dan gerust met de verpleegkundige. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de afdeling Neonatologie: www.neonatologie.asz.nl

Rode en groene kaarten

Graag willen we onze zorg verbeteren. Omdat we dit niet alleen kunnen, vragen we hiervoor uw medewerking. Zijn er zaken die volgens u verbeterd kunnen worden, vul dan een rode kaart in.

Bent u tevreden, vult u dan een groene kaart in. U kunt de kaarten in de daarvoor bestemde brievenbussen stoppen.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking namens het team van de afdeling Neonatologie en de Kinderafdeling.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
december 2019
pavo 1222