

Synacthentest

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Onderzoek op locatie Zwijndrecht:

- U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de **afdeling Dagbehandeling op locatie Zwijndrecht**.
- De verpleegkundige brengt u naar een bed, waar u voorafgaand aan het onderzoek een half uur ligt.
- Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.
- Bent u verhinderd? Bel dan zo spoedig mogelijk naar afdeling Dagbehandeling. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt worden gebruikt. U kunt bellen naar tel. (078) 654 21 22.

Onderzoek op locatie Dordwijk:

- U meldt zich op het afgesproken tijdstip op **verpleegafdeling D3** (Interne Geneeskunde) op **locatie Dordwijk**.
- De verpleegkundige brengt u naar een bed, waar u voorafgaand aan het onderzoek een half uur ligt.
- Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.
- Bent u verhinderd? Bel dan zo spoedig mogelijk naar afdeling D3. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt worden gebruikt. U kunt bellen naar tel. (078) 652 38 51.

Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u een synacthentest afgesproken. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

De synacthentest is een bloedonderzoek dat inzicht geeft in het functioneren van uw bijniere.

De bijniere liggen bovenop de niere. De buitenste laag van de bijnierschors produceert verschillende hormonen, waaronder het hormoon cortisol. Cortisol zorgt er onder andere voor dat uw bloeddruk en het bloedsuikergehalte op peil blijven. In stresssituaties maakt het bijnierschors extra cortisol aan. Als de werking van uw bijnierschors afneemt, is de hoeveelheid cortisol in uw bloed verlaagd.

Bij de synacthentest wordt bepaald of er voldoende cortisol wordt aangemaakt door uw bijnierschors. U krijgt bij de test synacthen ingespoten. Dit is een medicijn dat dezelfde werking heeft als een hormoon. Het zorgt ervoor dat het bijnierschors tijdelijk meer cortisol afgeeft aan het bloed. Met bloedafnames kan bepaald worden of uw bijniere goed werken. De hoeveelheid aangemaakte cortisol wordt voor en na het geven van de synacthen gemeten.

Vorbereiding

Als u medicijnen gebruikt, bespreekt uw behandelend arts met u of u tijdelijk moet stoppen met het innemen daarvan.

Op de ochtend van het onderzoek mag u een beschuit, een cracker of een schaalrtje yoghurt nemen met een kopje thee, koffie of melk.

Het onderzoek

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Toedienen synachten

De verpleegkundige brengt u naar een bed, waar u tijdens de test op ligt. Tijdens de test blijft u op het bed liggen of zitten in half zittende houding.

U krijgt een infuusnaaldje in uw arm. Via infuusnaaldje wordt bloed afgenomen en synachten gegeven.

Een half uur nadat het infuusnaaldje is ingebracht, wordt de eerste bloedafname gedaan. Na de eerste bloedafname wordt synachten gegeven. Door de synachten kunt u een opgejaagd gevoel krijgen. Een half uur daarna wordt er weer bloed afgenomen. Daarna wordt het infuusnaaldje verwijderd.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek mag u het ziekenhuis verlaten. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

De uitslag

Tijdens uw eerstvolgende afspraak bij uw behandelend arts krijgt u de uitslag van het onderzoek.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de verpleegkundigen van:

- Locatie Dordwijk
afdeling D3 (078) 652 38 51
U kunt vragen naar de endocrinologieverpleegkundige. Als de verpleegkundige op dat moment niet aanwezig is, wordt u teruggebeld.
- Locatie Zwijndrecht
Afdeling Dagbehandeling (078) 654 21 22

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
april 2021
pavo 1048