

# Hypogastricus blokkade

Behandeling van pijn bij kanker bij het  
Pijnbehandelcentrum

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

# informatie

# Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een Hypogastricus blokkade. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Een Hypogastricus blokkade is een behandeling van pijn bij kanker aan de organen in het bekken waarbij pijnstillers onvoldoende werken of te veel bijwerkingen hebben. Deze organen zijn bijvoorbeeld: de dikke darm of de geslachtsorganen.

Via de rug wordt onder röntgendoorlichting een naald naar de voorkant van de wervelkolom gebracht ter hoogte van de overgang van de laatste lendenwervel en het heiligbeen. Via deze naald wordt medicatie gespoten, waarna u vrijwel direct minder pijn heeft.

Als deze behandeling aan twee kanten wordt uitgevoerd kan dit leiden tot impotentie bij mannen.

Voor deze behandeling ligt u minimaal 24 uur in het ziekenhuis.

## Voorbereiding

Ter voorbereiding krijgt u:

- Een gesprek bij uw arts over de behandeling, resultaten en complicaties.
- Een voorlichtingsgesprek bij de verpleegkundige. Hierin wordt de voor- en nazorg besproken.

Wij adviseren u bij deze gesprekken uw partner of een familielid mee te nemen

## Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het soms nodig om voor de behandeling tijdelijk te stoppen met deze medicijnen.

De anesthesioloog heeft het volgende met u besproken:

- NSAID`S
- Plavix
- Acenocoumarol
- Marcoumar
- Acetylsalicylzuur /Ascal
  
- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen.
- Doorgaan met de aangekruiste medicijnen.

Is de dosering of het soort medicijnen die u gebruikt, veranderd na uw laatste bezoek bij uw arts? Dan moet u ons bellen om dit door te geven.

Gebruikt u meerdere medicijnen? En vindt u het lastig om alles te onthouden? Maakt u dan een medicijnlijst en neem dit mee. Uw apotheek kan dit ook voor u doen.

## Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen moet u dat vooraf aan uw arts te vertellen. Voor deze behandeling krijgt u preventief antibiotica.

## Zwangerschap

Als u zwanger bent of het vermoeden heeft zwanger te zijn, kan deze operatie niet plaatsvinden vanwege de röntgenstralen.

## **Geen bodylotion, nagellak en sieraden**

Op de dag van de behandeling mag u geen bodylotion gebruiken. Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, nagellak of make-up dragen. Houdt u hier thuis al rekening mee. Wilt u ervoor zorgen als u gelnagels draagt dat er op één nagel van uw hand of voet geen gelnagel zit? Het meten van het zuurstofgehalte in het bloed is namelijk niet mogelijk bij gelnagels.

## **Nuchter zijn**

- Als u voor 12.00 uur wordt behandeld, moet u nuchter zijn vanaf 24.00 uur de avond ervoor.
- Als u na 12.00 uur behandeld wordt, neemt u een licht ontbijt. Dit is een beschuit en een kopje thee.
- *Neemt u wel uw medicijnen in. (Behalve de bloedverduuners, volgens afspraak met uw arts).*
- Wij raden u af om vooraf te roken.
- Als u diabetes heeft, moet u dit aangeven. Uw arts zal u adviseren wat u vooraf moet doen.

## **Beleving**

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

## **Waar wordt de behandeling uitgevoerd?**

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft meerdere locaties. U hoort tijdens uw bezoek aan de polikliniek waar de behandeling plaatsvindt.

De mogelijke twee locaties zijn:

- Locatie Sliedrecht  
U meldt zich op de dag van de behandeling op de afdeling Dagbehandeling. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. Na de behandeling gaat u, via de verkoeverkamer, eerst terug naar de afdeling Dagbehandeling. Daarna gaat u per ambulance naar een verpleegafdeling op de locatie Dordwijk.

U wordt op de dag voor de behandeling door ons gebeld over het tijdstip waarop u zich op de afgesproken afdeling mag melden.

- **Locatie Dordwijk**

U meldt u zich op de afgesproken dag en tijd op de afgesproken afdeling. De behandeling vindt op de operatie-afdeling plaats.

Na de behandeling gaat u via de verkoeverkamer terug naar de verpleegafdeling.

Als u al bent opgenomen op een andere afdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis gaat u na de behandeling terug naar deze afdeling.

Uw arts bezoekt u voor en na de behandeling op de afdeling waar u ligt.

## **De opname**

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier krijgt u een operatiejasje aan en wordt uw pijngebied afgetekend. Daarna wordt u naar de operatieafdeling gebracht.

## **De behandeling**

Er wordt een infuusnaaldje in uw arm gebracht. Via dit infuusnaaldje krijgt u antibiotica. Ook krijgt u een slaapmiddel of pijnstillend middel (roesje), zodat u minder merkt van de behandeling.

U ligt tijdens deze behandeling op uw buik op de behandelafel. Daarna wordt onder röntgendoorlichting een dunne naald via de rug bij de vierde lendenwervel schuin opgeschoven tot aan de voorkant van de wervelkolom ter hoogte van de vijfde lendenwervel en het heiligbeen. Met contrastvloeistof wordt gekeken of de naald in de juiste positie staat.

Daarna wordt met röntgendoorlichting gedoseerd fenol 10% oplossing gespoten. Dit zorgt vaak direct voor vermindering van de pijn.

Na de behandeling wordt de naald verwijderd en heeft u drie uur bedrust. De behandeling kan meer dan zes maanden een pijnstillend effect geven.

Soms voert de arts alleen maar een blokkade uit om een diagnose te kunnen stellen. In dat geval spuit de arts alleen een verdovingsmiddel om te kijken of deze tumor uw pijn veroorzaakt.

## Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Als er geen bijzonderheden zijn en als de anesthesioloog het goed vindt, brengt de verpleegkundige u naar de afdeling.

Op de polikliniek heeft de arts u verteld dat de behandeling invloed heeft op de (aangrenzende) zenuwbanen en weefsels. De behandeling kan de volgende bijwerkingen hebben:

- Incontinentie voor urine en ontlasting.
- Spierzwakte in de benen.
- Verlies van gevoel of juist overgevoeligheid van uw benen en/of het zitvlak.
- Beschadiging doordat een deel van de te geven vloeistof in de bloedbaan komt.
- Impotentie.

We raden u aan om uw temperatuur te controleren. Bij een oplopende temperatuur boven de 38°C moet u contact opnemen met uw (huis)arts of buiten kantoor tijden met de huisartsartsenpost.

### De volgende ochtend

Als er geen complicaties zijn mag u de volgende ochtend *onder begeleiding* naar huis. Soms zal uw behandelend arts met u overleggen om in het ziekenhuis te blijven. Dit kan zijn om een andere reden dan de pijn.

Ter controle krijgt u een telefonische afspraak met de verpleegkundig specialist of consulent chronische pijn.

Daarna wordt u verwezen naar uw behandelend arts. Dat kan iemand anders zijn dan de arts die u voor deze pijnblokkade geholpen heeft. Uw behandelend arts kan altijd opnieuw contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum als uw pijn toeneemt.

## Een arts waarschuwen

U neemt contact op met het Pijnbehandelcentrum bij:

- Koorts (oplopende temperatuur boven de 38°C).
- Infectie (roodheid, pus, pijn, warme huid bij de insteekopening van de naald).
- Krachtsverlies.
- Hoofdpijn.
- Verandering in urine en/of ontlastingspatroon.
- Onbegrepen klachten.

## Bereikbaarheid

Bij problemen neemt u contact op via onderstaande nummers. Zij zullen uw behandelend arts informeren.

- Van maandag - vrijdag belt u tussen 08.30 -15.30 uur naar het Pijnbehandelcentrum, tel. (0184) 43 42 19.
- Van maandag - vrijdag tussen 15.30 - 08.00 uur en in het weekend, belt u naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel (078) 652 32 10.

## Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op werkdagen bellen naar het secretariaat van het Pijnbehandelcentrum, tel. (0184) 43 42 19.

Albert Schweitzer ziekenhuis  
januari 2019  
pavo 0805