

# Splanchnicus blokkade

Behandeling van pijn bij kanker bij het  
Pijnbehandelcentrum

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

# informatie

# Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een Splanchnicus blokkade. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Een Splanchnicus blokkade is een behandeling voor pijn bij kanker in de bovenbuik (alvleesklier, maag, lever, galblaas, dunne darm). Deze behandeling kan al in een vroeg stadium van pijnklachten overwogen worden. Maar ook als medicatie niet meer voldoende helpt. Soms wordt deze blokkade voorafgegaan door een Plexus Coeliacus blokkade.

Plexus betekent 'zenuwknoop of zenuwbundel'. Coeliacus is de benaming van deze zenuwbundel die aan de voorkant van de wervelkolom bij de eerste lendenwervel ligt. Bij de Splanchnicus blokkade worden de 'toevoerwegen' (zenuwbanen) naar deze zenuwbundel behandeld.

Onder röntgendoorlichting worden twee dunne naalden via de rug in de toevoerweg van de zenuwbundel gebracht. Hierdoor wordt medicatie gespoten die de zenuwbundel uitschakelt. Meestal verdwijnt of verminderd de pijn direct.

Voor deze behandeling ligt u maximaal één uur op uw buik en wordt u minimaal 24 uur in het ziekenhuis opgenomen.

# Vorbereiding

Ter voorbereiding krijgt u:

- Een gesprek bij uw arts over de behandeling, resultaten en complicaties.
- Een voorlichtingsgesprek bij de verpleegkundige. Hierin wordt de voor- en nazorg besproken.

Wij adviseren u bij deze gesprekken uw partner of een familielid mee te nemen.

## Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, is het soms nodig om voor de behandeling tijdelijk te stoppen met deze medicijnen.

De anesthesioloog heeft het volgende met u besproken:

- NSAID`S
- Plavix
- Acenocoumarol
- Marcoumar
- Acetylsalicylzuur /Ascal
- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen.
- Doorgaan met de aangekruiste medicijnen.

Is de dosering of het soort medicijnen die u gebruikt, veranderd na uw laatste bezoek bij uw arts? Dan moet u ons bellen om dit door te geven.

Gebruikt u meerdere medicijnen? En vindt u het lastig om alles te onthouden? Maakt u dan een medicijnlijst en neem dit mee. Uw apotheek kan dit ook voor u doen.

## Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen, moet u dat vooraf aan uw arts te vertellen. Voor deze behandeling krijgt u preventief antibiotica.

## Nuchter zijn

- Als u voor 12.00 uur wordt behandeld, moet u nuchter zijn vanaf 24.00 uur de avond ervoor.
- Als u na 12.00 uur behandeld wordt, neemt u een licht ontbijt. Dit is een beschuit en een kopje thee.
- *Neemt u wel uw medicatie in. (Behalve de bloedverdünners, volgens afspraak met uw arts).*

- Wij raden u af om vooraf te roken.
- Als u diabetes heeft, moet u dit aangeven. Uw arts zal u adviseren wat u vooraf moet doen.

### **Geen bodylotion, nagellak en sieraden**

Op de dag van de behandeling mag u geen bodylotion gebruiken. Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, nagellak of make-up dragen. Houdt u hier thuis al rekening mee. Wilt u ervoor zorgen als u gelnagels draagt dat er op één nagel van uw hand of voet geen gelnagel zit? Het meten van het zuurstofgehalte in het bloed is namelijk niet mogelijk bij gelnagels.

### **Beleving**

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

### **Waar wordt de behandeling uitgevoerd?**

De dag voor de behandeling wordt u gebeld over het tijdstip van de opname.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft meerdere locaties. U hoort tijdens uw bezoek aan de polikliniek waar de behandeling plaatsvindt. De twee mogelijke locaties zijn:

- **Locatie Sliedrecht**  
U meldt zich op de dag van de behandeling op de afdeling Dagbehandeling van de locatie Sliedrecht. De behandeling vindt plaats op de operatieafdeling.  
Na de behandeling gaat u, via de verkoeverkamer, eerst terug naar de afdeling Dagbehandeling en daarna gaat u per ambulance naar locatie Dordwijk.
- **Locatie Dordwijk**  
U meldt u zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling die aan u doorgegeven is. De behandeling vindt op de operatieafdeling plaats. Na de behandeling gaat u via de verkoeverkamer terug naar de verpleegafdeling.

Als u al bent opgenomen op een andere afdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis gaat u na de behandeling terug naar deze afdeling.

Uw arts bezoekt u voor en na de behandeling op de afdeling waar u ligt.

## De opname

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier krijgt u een operatiejasje aan en wordt uw pijngebied afgetekend. Daarna wordt u naar de operatieafdeling gebracht.

## De behandeling

Er wordt een infuusnaaldje in uw arm gebracht. Via dit infuusnaaldje krijgt u antibiotica. Ook krijgt u een slaapmiddel of pijnstillend middel (roesje), zodat u minder merkt van de behandeling.

U ligt tijdens deze behandeling maximaal één uur op uw buik op de behandeltafel. Onder röntgendoorlichting worden twee dunne naalden in de zenuwbanen van de plexus coeliacus gebracht. Met contrastvloeistof worden deze zenuwbanen in beeld gebracht en gecontroleerd of de naalden goed staan.

Vervolgens wordt via deze naald onder röntgendoorlichting alcohol 96% ingespoten. De naalden worden daarna verwijderd. Daarna is er vaak direct pijnvermindering.

Na de behandeling heeft u drie uur bedrust.

Soms voert de arts alleen maar een blokkade uit om een diagnose te kunnen stellen. In dat geval spuit de arts alleen een verdovingsmiddel om te kijken of deze tumor uw pijn veroorzaakt.

# Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Als er geen bijzonderheden zijn en als de anesthesioloog het goed vindt, brengt de verpleegkundige u naar de afdeling.

Op de polikliniek heeft de arts u verteld dat de behandeling invloed heeft op de (aangrenzende) zenuwbanen en weefsels.

De behandeling kan de volgende bijwerkingen hebben:

- Misselijkheid en diarree.
- Duizeligheid als u te snel van houding veranderd.
- Problemen met de potentie
- Problemen of pijn bij de ademhaling. Dit kan ontstaan als tijdens de behandeling het longvlies wordt geraakt. Een controlefoto van de longen op röntgenafdeling is dan nodig.
- Uitvalsverschijnselen waarbij u geen kracht heeft in uw benen.
- Napijn.

We raden u aan om uw temperatuur te controleren. Bij een oplopende temperatuur boven de 38°C moet u contact opnemen met uw (huis)arts of buiten kantoor tijden met de huisartsenpost.

## De volgende ochtend

Als er geen complicaties zijn mag u de volgende ochtend *onder begeleiding* naar huis. Soms zal uw behandelend arts met u overleggen om in het ziekenhuis te blijven. Dit kan zijn om een andere reden dan de pijn.

Ter controle krijgt u een telefonische afspraak met de verpleegkundig specialist of consulent chronische pijn.

Daarna wordt u verwezen naar uw behandelend arts. Dat kan iemand anders zijn dan de arts die u voor deze pijnblokkade geholpen heeft. Uw behandelend arts kan altijd opnieuw contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum als uw pijn toeneemt.

# Een arts waarschuwen

U neemt contact op met het ziekenhuis bij:

- Koorts (oplopende temperatuur boven de 38°C).
- Infectie (roodheid, pus, pijn, warme huid bij de insteekopening van de naald).
- Toename pijnklachten.
- Krachtsverlies.
- Ademhalingsproblemen.
- Aanhoudende diarree.
- Onbegrepen klachten.

## Bereikbaarheid

Bij vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen naar het Pijnbehandelcentrum tussen 08.15 -12.15 uur en 13.15-15.30.

**Let op wij gaan verhuizen.** Vanaf 15 juli 2019 is het Pijnbehandelcentrum gevestigd op de locatie Zwijndrecht en verandert het telefoonnummer!

- Tot en met 14 juli 2019 is het telefoonnummer: (0184) 43 42 19.
- Vanaf 15 juli 2019 is het telefoonnummer: (078) 6542219.

### Buiten kantoortijden

Buiten deze tijden kunt u in geval van spoed bellen naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:  
[www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

Albert Schweitzer ziekenhuis  
mei 2019  
pavo 0804