

Keuzehulp operatie bij borstkanker

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Keuzehulp operatie bij borstkanker

(zie ook www.keuzehulp.info)

Voor veel vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium zijn er twee operaties mogelijk: een borstsparende operatie of een borstamputatie. Deze keuzehulp geeft beknopte informatie over beide operaties. Het kan u helpen aan te geven wat uw afwegingen en voorkeuren zijn. Zo kiest u samen met de specialist de operatie die het beste bij u past.

	Borstsparende operatie	Borstamputatie
Operatie	<ul style="list-style-type: none">• Uw borst blijft zoveel mogelijk behouden. Alleen de tumor (met daaromheen een randje gezond weefsel) wordt weggehaald.• Het is een relatief kleine operatie.• U kunt meestal dezelfde dag weer naar huis.• Als de 'snijranden' niet schoon zijn moet u opnieuw worden geopereerd. Dit is bij ongeveer 4% van de patiënten nodig.• Meestal snel herstel.	<ul style="list-style-type: none">• Uw gehele borst wordt verwijderd.• Deze operatie is iets uitgebreider. U krijgt een drain in het geopereerde gebied om het vocht af te voeren. Deze drain kan meestal na een aantal dagen worden verwijderd.• U verblijft meestal een dag en een nacht in het ziekenhuis.• Opnieuw opereren is zelden nodig.• Herstel kan langer duren.

	Borstsparende operatie	Borstamputatie
Bestraling	Na een borstsparende operatie is meestal bestraling (radiotherapie) nodig.	Waarschijnlijk is er geen bestraling nodig. In een klein aantal gevallen is dit wel nodig. Soms kan de chirurg u dit al van te voren vertellen. Soms blijkt pas achteraf dat alsnog bestraling nodig is.

	Borstsparende operatie	Borstamputatie
Overlevingskans	Een borstsparende operatie wordt alleen geadviseerd als de kans op overleving even groot is als bij een borstamputatie. Als u dus in aanmerking komt voor een borstsparende operatie, heeft u een even grote overlevingskans als wanneer u zou kiezen voor een borstamputatie.	

	Borstsparende operatie	Borstamputatie
Opnieuw borstkanker	U heeft een iets grotere kans op een nieuwe vorm van borstkanker in dezelfde borst. Het verschil is echter heel klein: Gemiddeld 1 op de 100 vrouwen krijgt binnen 5 jaar een nieuwe vorm van borstkanker.	U heeft een iets kleinere kans op een nieuwe vorm van borstkanker in het operatie litteken. Het verschil is echter heel klein: Gemiddeld minder dan 1 op de 100 vrouwen krijgt een nieuwe vorm van borstkanker.

	Borstsparende operatie	Borstamputatie
Kanker ergens anders in het lichaam	De kans dat dezelfde borstkanker weer terug komt ergens anders in het lichaam is even groot. Dit gebeurt gemiddeld bij ongeveer 4 van de 100 vrouwen binnen 5 jaar.	

	Borstsparende operatie	Borstamputatie
Tevredenheid	91 van de 100 vrouwen zijn na een borstsparende operatie tevreden met hoe de borst eruit ziet.	73 van de 100 vrouwen zijn na een borstamputatie tevreden over hoe de borst eruit ziet. Na een borstreconstructie zijn 80 van de 100 vrouwen tevreden.

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2020
pavo 1579