

Bronchoscopie

Kijkonderzoek in de luchtwegen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een bronchoscopie. In deze folder leest u hier meer over.

Wat is een bronchoscopie?

Bij een bronchoscopie wordt met een dunne flexibele slang (bronchoscoop) in uw luchtwegen gekeken. Met dit onderzoek kunnen afwijkingen in uw luchtwegen ontdekt worden. Verder is het mogelijk een stukje weefsel of een aantal cellen weg te nemen voor nader onderzoek.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereiding

Nuchter

Tot **6** uur vóór het onderzoek mag u nog iets drinken en een lichte maaltijd gebruiken. U mag bijvoorbeeld een boterham eten. Daarna moet u **nuchter** blijven. Dit betekent dat u vanaf dat moment niet meer mag eten en drinken.

Als de bronchoscopie onder sedatie gedaan wordt, gelden er andere regels. Zie hiervoor dan de aparte folder.

Roken

Het is verstandig om in de uren vóór uw onderzoek niet te roken. De luchtwegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen.

Medicijngebruik

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de longarts met u hoeveel dagen voor het onderzoek u moet stoppen met het gebruik daarvan. Als dit niet met u is besproken, belt u dan naar de Longfunctieafdeling om dit aan te geven. Bent u onder behandeling van de Trombosedienst? Dan wordt op de dag van het onderzoek in het ziekenhuis uw bloed nog gecontroleerd (INR-waarde).

Overige medicijnen kunt u met een slokje water innemen.


Als u inhalatiemedicijnen (pufjes) gebruikt, is het belangrijk dat u deze **blijft gebruiken**.

Het onderzoek

U neemt plaats op een stoel of bed. Als u een gebitsprothese draagt, vragen we u deze voor het onderzoek uit te doen. Daarna verdooft de verpleegkundige uw keel met een spray. Deze spray heeft een bittere smaak. De verdoving geeft een dik gevoel in uw keel.

Zodra de verdoving in uw keel werkt, wordt ook het bovenste gedeelte van uw luchtpijp verdoofd met de spray. Tijdens het verdoven kunt u hoestprikkels en soms ook braakneigingen krijgen.

Vervolgens neemt u plaats op de onderzoeksbank. De longarts brengt een bronchoscoop in uw luchtwegen. Via de bronchoscoop bekijkt de longarts uw luchtwegen. Als er een stukje weefsel voor onderzoek weggenomen wordt, kan dit een klein beetje bloeden.



Afbeelding: de bronchoscoop in de luchtwegen

Soms is het nodig enkele cellen voor verder onderzoek weg te nemen. Er wordt dan een beetje vloeistof in uw luchtwegen gespoten en weer weggezogen. Dit wordt naar het laboratorium gestuurd voor verder onderzoek.

Het totale onderzoek, inclusief verdoven, duurt ongeveer een ½ uur. Het bekijken van uw luchtwegen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Het onderzoek is pijnloos.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u het ziekenhuis verlaten. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Toch kan het prettig zijn om door iemand naar huis gebracht te worden. Als u al in het ziekenhuis was opgenomen, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht. Als er een stukje weefsel is weggenomen, kunt u op de dag van het onderzoek nog wat bloed ophoesten.

Niets eten en drinken

Zolang uw keel nog verdoofd is, mag u niets eten of drinken. U kunt zich dan verslikken. De verdoving is na ongeveer een uur uitgewerkt.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De longarts bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgspraak.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling Longfunctie, locatie Dordwijk, tel. (078) 654 24 45. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag. Ook als u verhinderd bent, belt u naar dit nummer.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

De afbeeldingen in deze folder zijn afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2022
pavo 0453