

Blokkade van de lumbale sympathicus

Via een RF-laesie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Uw afspraak

De afspraak voor uw behandeling is gemaakt op:

_____ dag _____

Uw behandeling vindt plaats op de operatiekamer van de locatie Zwijndrecht.

- Eén werkdag voor uw behandeling belt u tussen 15.00 -16.00 uur naar tel. (078) 654 10 04. U hoort dan het tijdstip en de afdeling waarop wij u verwachten.
- Als uw behandeling op maandag plaatsvindt, vragen we u om op vrijdag te bellen.

Praktische informatie

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, is het soms nodig om voor de behandeling tijdelijk te stoppen met deze medicijnen.

De anesthesioloog heeft het volgende met u besproken:

- NSAID`S
- Plavix
- Acenocoumarol
- Marcoumar
- Acetylsalicylzuur /Ascal

- _____
- _____

- _____ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen.
- Doorgaan met de aangekruiste medicijnen.

Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, dan moet u dat vooraf aan uw arts vertellen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, raden we u aan om te bellen naar het Pijn-behandelcentrum. Bij de behandeling worden namelijk röntgenstralen gebruikt. U hoort dan of uw behandeling kan doorgaan.

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. U kunt op de dag dat u wordt behandeld, het beste iets eten dat licht verteerbaar is. Een lichte maaltijd is bijvoorbeeld brood, crackers of beschuit met zoet beleg en een kopje thee.

Geen bodylotion, nagellak en sieraden

Op de dag van de behandeling mag u geen bodylotion gebruiken. Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, nagellak of make-up dragen. Houdt u hier thuis al rekening mee.

U hoeft geen nachtkleding mee te nemen.

Belangrijk

Na de behandeling mag u zelf 24 uur geen voertuig besturen. Zorgt u er dus voor dat iemand u na de behandeling naar huis kan brengen.

Lumbale sympathicus-blokkade

Bij een blokkade van de lumbale sympathicus wordt de zenuwbaan geblokkeerd. Deze zenuwbaan loopt aan de voorzijde van de wervelkolom. Deze behandeling wordt gedaan bij mensen met pijn aan de wervelkolom en/of het been (sympathische reflex-dystrofie), bij doorbloedingsstoornissen van het been en bij bepaalde zenuwpijnen.

De behandeling is gericht op het gevoelsdeel van de zenuw (sensibele deel). Het heeft geen invloed op het deel van de zenuw dat de bewegingen aanstuurt (motorische deel).

Voor deze behandeling wordt u een paar uur opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van locatie Zwijndrecht.

Uw opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier krijgt u een operatiejasje aan en tekenen we het gebied waar u pijn heeft af. Daarna brengt de verpleegkundige u naar de verkoeverkamer. Daar krijgt u een infuus en wordt u aangesloten op de bewakingsmonitor. Vervolgens gaat u naar de operatieafdeling, waar de pijnspecialist (anesthesioloog) u behandelt.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De behandeling

De behandeling vindt onder röntgendoorlichting plaats. Hierdoor kan de pijnspecialist heel nauwkeurig bepalen waar de naalden ingebracht moeten worden. Hij controleert of de naalden op de juiste plaats zitten door er lichte stroom op te zetten of een contrastvloeistof in te spuiten. Daarna wordt de zenuwbaan verdoofd en wordt de zenuw via stroom met warmte behandeld (een zogeheten RF-laesie).

Na de behandeling

Na de behandeling brengen we u naar de verkoeverkamer. Als er geen bijzonderheden zijn en als de pijnspecialist het goed vindt, brengt de verpleegkundige u naar de afdeling.

Als u zich goed voelt kunt u na overleg met de verpleegkundige weer naar huis.

Weer thuis

Bijwerkingen

Na de behandeling kan uw been en/of voet opzwellen. Dit komt doordat er meer bloed naar uw been gaat dan vóór de behandeling. De zwelling gaat vanzelf weer weg.

Verder kunt u een zenuwpijn of een doof gevoel in uw lies en bovenbeen voelen. Deze klachten verdwijnen in enkele weken.

Napijn

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Dit kan een paar dagen tot weken duren. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. Dit kunnen uw eigen pijnstillers zijn of paracetamol volgens de dosering op de bijsluiter.

Resultaat van de behandeling

Het doel van de behandeling is de doorbloeding in been en voet te verbeteren, waardoor de pijn meestal minder wordt. Hoe lang deze behandeling effect heeft, verschilt per patiënt. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Bij het ontslag uit het ziekenhuis, krijgt u een afspraak mee voor een controle bij de pijnspecialist of verpleegkundig specialist op het Pijnbehandelcentrum.

Bereikbaarheid

Bij vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen naar het Pijnbehandelcentrum, tel. (078) 6542219. We zijn bereikbaar tussen 08.15 -12.15 uur en 13.15-15.30.

Buiten kantoor tijden

Buiten deze tijden kunt u in geval van spoed bellen naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2020
pavo 0465