

Chemische lumbale sympathectomie (CLS)

Behandeling van de zenuwstreng aan de voorzijde van de wervelkolom

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

De anesthesioloog heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een chemische lumbale sympathectomie (CLS) als behandeling voor uw beenpijn. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Chemische lumbale sympathectomie

Bij een CLS behandeling wordt de zenuwbaan die aan de voorzijde van de wervelkolom loopt, geblokkeerd. Deze behandeling wordt geadviseerd bij patiënten met pijn aan de wervelkolom en/of been (bijvoorbeeld CRPS), bij doorbloedingsstoornissen of bij bepaalde zenuwpijnen. De behandeling is gericht op het sensibele (gevoels)deel en heeft geen invloed op het motorische deel van de zenuw (het deel dat de beweging aanstuurt).

- Over de datum van uw behandeling krijgt u telefonisch of schriftelijk bericht.
- U heeft een afspraak op: _____ dag _____.

Vorbereiding

Ter voorbereiding op de behandeling krijgt u:

- Een gesprek bij uw arts over de behandeling, resultaten en complicaties.
- Een (telefonisch) voorlichtingsgesprek bij de verpleegkundige. Hierin wordt de voor- en nazorg besproken.

Wij raden u aan bij alle gesprekken uw partner of een familielid mee te nemen.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het nodig dat u hiermee voor de behandeling tijdelijk stopt. Uw arts heeft met u het volgende afgesproken.

- NSAID`S
- Ascal
- Plavix
- Acenocoumarol
- Marcomar
- Acetylsalicylzuur/Ascal
-
- dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen.

Als de dosering of het soort medicijnen dat u gebruikt veranderd zijn na uw laatste bezoek bij uw arts, moet u telefonisch contact opnemen. Gebruikt u meerdere medicijnen en vindt u het lastig om alles te onthouden? Maakt u dan een medicijnlijst en neem dit mee. Uw apotheek kan dit ook voor u doen.

Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, moet u dat vooraf aan uw arts te vertellen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, raden wij u aan om te bellen naar het Pijnbehandelcentrum. U hoort dan of uw behandeling door kan gaan.

Dag voor de behandeling

De dag voor uw behandeling wordt u tussen 11.00 - 13.30 uur door een medewerker van het Pijnbehandelcentrum gebeld. U hoort dan het tijdstip waarop u verwacht wordt.

Als u op maandag wordt behandeld, wordt u op vrijdag gebeld.

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. U kunt op de dag dat u wordt behandeld het beste iets eten dat licht verteerbaar is. Een lichte maaltijd is: brood, crackers of beschuit met zoet beleg en een kopje thee.

Geen bodylotion, nagellak en sieraden

Tijdens de behandeling mag u geen bodylotion op hebben. Ook mag u geen sieraden, nagellak of make-up dragen. Houdt u hier thuis al rekening mee.

Belangrijk

Na de behandeling mag u zelf 24 uur geen voertuig besturen. Zorgt u er dus voor dat iemand u na de behandeling naar huis kan brengen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Uw opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Dagbehandeling van locatie Sliedrecht.

Hier krijgt u een operatiejasje aan en wordt uw pijnkant afgetekend.

Daarna wordt u naar de operatieafdeling gebracht. Daar wordt een infuusnaaldje in uw arm gebracht. Via dit infuusnaaldje kan tijdens de behandeling medicatie gegeven worden.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u voorover op de behandeltafel met een kussen onder uw buik. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling stil ligt.

De arts geeft een plaatselijke verdoving in de huid op de plaats waar de naald ingebracht gaat worden. Daarna wordt de naald, onder röntgendoorlichting naar de voorkant van uw wervelkolom gebracht. Als de naald in de goede positie staat wordt er een kleine hoeveelheid chemische vloeistof ingespoten. Het inspuiten kan gevoelig zijn. De arts controleert op röntgenbeeld het verloop van de behandeling.

Als de behandeling klaar is, wordt de naald verwijderd en wordt het gaatje afgeplakt met een pleister.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Als er geen bijzonderheden zijn en als de anesthesioloog het goed vindt, brengt de verpleegkundige u weer naar de afdeling Dagbehandeling.

Als u zich goed voelt, kunt u na overleg met de verpleegkundige weer naar huis. Dit is meestal na ongeveer één uur.

Weer thuis

De eerste dagen na de behandeling kunt u napijn hebben of spierpijn in uw rug. Dit is normaal en gaat vanzelf weer over. Voor uw napijn kunt u paracetamol gebruiken.

Een arts waarschuwen

U moet bellen met het Pijnbehandelcentrum bij:

- Koorts: oplopende temperatuur boven de 38°C.
- Infectie: roodheid, pus, pijn, warme huid bij de insteekopening van de naald in de rug.
- Toename van de pijn.
- Onbegrepen klachten.

Bereikbaarheid

Bij vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen naar het Pijnbehandelcentrum tussen 08.15 -12.15 uur en 13.15-15.30.

Let op wij gaan verhuizen. Vanaf 15 juli 2019 is het Pijnbehandelcentrum gevestigd op de locatie Zwijndrecht en verandert het telefoonnummer!

- Tot en met 14 juli 2019 is het telefoonnummer: (0184) 43 42 19.
- Vanaf 15 juli 2019 is het telefoonnummer: (078) 6542219.

Buiten kantoortijden

Buiten deze tijden kunt u in geval van spoed bellen naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
mei 2019
pavo 1016