

Stellatumblokkade

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Uw afspraak

De afspraak voor uw behandeling

is gemaakt op: _____ dag

Uw behandeling vindt plaats op de operatiekamer van de locatie
Zwijndrecht.

- Eén werkdag voor uw behandeling belt u tussen 15.00 - 16.00 uur naar tel. (078) 654 10 04. U hoort dan het tijdstip en de afdeling waarop wij u verwachten.
- Als uw behandeling op maandag plaatsvindt, vragen wij u om op vrijdag te bellen.

Praktische informatie

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, is het soms nodig dat u voor de behandeling tijdelijk stopt met deze medicijnen. De pijnspecialist heeft het volgende met u besproken:

- NSAID
- Plavix
- Acenocoumarol
- Marcoumar
- Acetylsalicylzuur/Ascal

- _____

- _____

- Doorgaan met de aangekruiste medicijnen.

- _____ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen.

Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, dan moet u dat vooraf aan uw arts vertellen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, raden wij u aan om te bellen naar het Pijnbehandelcentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Belangrijk

Na de behandeling mag u zelf 24 uur geen voertuig besturen. Zorgt u ervoor dat iemand u na uw behandeling naar huis kan brengen.

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. We raden u aan op de dag van de behandeling licht verteerbaar voedsel te nemen.

U hoeft **geen nachtkleding mee** te nemen.

Geen sieraden, make-up, nagellak en bodylotion

Op de dag van de behandeling mag u geen bodylotion gebruiken. Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, nagellak of make-up dragen. Houdt u hier thuis al rekening mee. Wilt u ervoor zorgen als u gelnagels draagt, dat er op één nagel van uw hand of voet geen gelnagel zit? Het meten van het zuurstofgehalte in uw bloed is namelijk niet mogelijk bij gelnagels.

Stellatumblokkade

Bij een stellatumblokkade wordt een zenuwknoop in de hals, bij de zevende nekwervel geblokkeerd. Deze behandeling krijgen mensen met zenuwpijnen in de onderkaak, nek, schouder, borst en arm. Ook mensen met een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) van de arm kunnen deze behandeling krijgen.

De behandeling is gericht op het sensibele (= gevoels) deel van de zenuw en heeft geen invloed op het motorische deel van de zenuw, (= het deel dat de bewegingen aanstuurt).

Voor deze behandeling wordt u een paar uur opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van locatie Zwijndrecht.

De behandeling (verloop)

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Dagbehandeling. Op de afdeling trekt u een operatiejasje aan. Hierna brengt de verpleegkundige u naar de operatiekamer.

De behandeling vindt plaats met behulp van röntgenbeelden. Hierdoor kan de pijnspecialist heel nauwkeurig de plaats bepalen waar de naald ingebracht moet worden.

De pijnspecialist controleert of de naald op de juiste plaats zit, door er lichte stroom op te zetten. Daarna wordt de zenuw met stroom of warmte behandeld. Met deze behandeling wordt de pijngeleiding van de zenuw beïnvloed. Hierdoor wordt de pijn meestal minder.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer) gebracht. Als er geen bijzonderheden zijn brengt de verpleegkundige u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Als u zich goed voelt kunt u na overleg met de verpleegkundige weer naar huis.

Bijwerkingen

- Soms kunt u na de behandeling iets wazig zien of uw ooglid kan wat afhangen. Dit komt door de plaatselijke verdoving en verdwijnt binnen een paar uur.
- U kunt een paar dagen het gevoel hebben dat u een brok in de keel heeft.
- Ook kan er een blauwe plek in uw hals ontstaan. Dit komt heel weinig voor.
- Er bestaat een kleine kans dat de pijnspecialist tijdens de behandeling het longvlies raakt, waardoor een klaplong (pneumothorax) kan ontstaan.

Napijn

Na de behandeling kunt u napijn hebben, die een paar dagen tot weken kan duren. U kunt hiervoor pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat.

Resultaat van de behandeling

Pas na enkele weken kunnen u en de pijnspecialist beoordelen of de behandeling goed heeft gewerkt. Het is mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Bereikbaarheid

Het Pijnbehandelcentrum is gevestigd op locatie Zwijndrecht, route 42. Bij vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen naar het Pijnbehandelcentrum tussen 08.15 -12.15 uur en 13.15-15.30 uur, tel. (078) 654 22 19.

Buiten kantoortijden

Buiten deze tijden kunt u in geval van spoed bellen naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2020
pavo 0464