

Injectie met dexamethason in het middenoor

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Heeft u de ziekte van Ménière of wordt uw gehoor opeens minder, dan kan de KNO-arts adviseren dat u een injectie met dexamethason in het middenoor krijgt. Dexamethason is een medicijn dat ontstekingen vermindert. Deze injectie heet ook wel intratympanale injectie. Dit is een eenvoudige behandeling. In deze folder leest u hier meer over.

Doel van de behandeling

Kenmerken van de ziekte van Ménière zijn aanvallen van duizeligheid en klachten van het gehoor. De behandeling kan ervoor zorgen dat u minder vaak duizelig bent en dat de duizeligheid verminderd. Wordt uw gehoor opeens minder, dan kan de behandeling helpen om het gehoor te verbeteren.

We weten nog niet helemaal hoe de injectie precies werkt in het middenoor. Wat we wel weten is dat het goed helpt tegen duizeligheid en dat het evenwichtsorgaan blijft werken.

De behandeling

Verdooving

De verpleegkundige verdooft eerst het trommelvlies in uw oor. Dat gebeurt met een verdovingsvloeistof die in de gehoorgang wordt gedruppeld. Na tien tot vijftien minuten verwijdert de KNO-arts de verdovingsvloeistof uit uw oor. Het trommelvlies is nu verdoofd.

Injectie

De KNO-arts prikt met een dunne naald door het trommelvlies en spuit de dexamethason in het middenoor. Het inspuiten van de vloeistof kan een vol of prikkelend gevoel geven in het oor. Het kan zijn dat dit gevoel een paar dagen blijft.

Na de injectie

Om ervoor te zorgen dat de vloeistof zo goed mogelijk werkt, blijft u 15 minuten liggen. U ligt dan op uw zij of met uw hoofd gedraaid. In die 15 minuten mag u niet slikken. Als u slikt, gaat de buis van Eustachius open en kan de vloeistof weggelopen via uw keel. Dan werkt het niet meer. Na 15 minuten mag u voorzichtig opstaan. U maakt een vervolgspraak aan de balie. Daarna mag u naar huis.

Begeleider meenemen

Na de injectie kunt u een beetje duizelig zijn. Daarom is het belangrijk dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.

Na de behandeling

De eerste dagen na de behandeling kunt u nog een beetje duizelig zijn of het gevoel hebben dat u niet stevig staat. Ook kunt u een prikkelend gevoel hebben in uw oor. Hiervoor kunt u paracetamol nemen. Heftige duizeligheidsaanvallen komen niet vaak voor, maar zijn mogelijk. U hoeft daar niet ongerust over te zijn. Wel is het belangrijk dat u zo snel mogelijk weer gaat bewegen. Ook als u duizelig bent is het goed dat u in beweging blijft.

Gaatje in trommelvlies

Door de injectie heeft u een gaatje in het trommelvlies. Dit gaatje groeit weer dicht. Dat duurt een paar dagen en soms wat langer. Twee weken na de behandeling is het gaatje meestal helemaal dicht.

De eerste week na de behandeling moet u ervoor zorgen dat uw oor droog blijft. U mag wel douchen. Bij het wassen van de haren moet u het oor afdekken.

Risico's

Er zijn weinig risico's bij deze behandeling. Er is een kleine kans op een bloeding, een ontsteking, een loopoor of een blijvend gaatje in het trommelvlies. Als u een van deze klachten krijgt, moet u de polikliniek KNO bellen.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur bellen naar de polikliniek KNO, tel: (078) 654 71 00.

Meer informatie

Meer informatie over aandoeningen en behandelingen van keel, neus en oren kunt u lezen op de website www.kno.nl.

Wilt u meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de afdeling KNO, kijkt u dan op www.kno.asz.nl.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2024
pavo 1799