

Marcaïnisatie van een gewricht

Op de afdeling Radiologie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort heeft u een afspraak voor een marcaïnisation van een gewricht. In deze folder leest u hier meer over.

Doel van het onderzoek

Bij een marcaïnisation wordt een vloeistof in één van uw gewrichten gespoten. De injectievloeistof bestaat uit een mengsel van een verdovende vloeistof (Bupivacaïne®) en een ontstekingsremmer (Depo-medrol®). Soms wordt er alleen een verdovende vloeistof gegeven. Dit is afhankelijk van de situatie.

Bij een marcaïnisation van de heup wordt dit gedaan om te testen of de pijn die u nu heeft, wel of niet uit uw heup komt. Als de pijn vermindert of verdwijnt komen de problemen waarschijnlijk uit het heupgewricht. Als de pijn niet vermindert of verdwijnt, komt de pijn niet uit de heup, maar bijvoorbeeld uit uw rug.

Vorbereiding

Vervoer naar huis

Uw gewricht wordt tijdens het onderzoek verdoofd. U mag daarom de eerste 24 uur na het onderzoek zelf geen voertuig besturen. We raden u aan om te regelen dat iemand u komt ophalen.

Allergisch

Allergie voor Bupivacaïne® is uiterst zeldzaam. Als u toch allergisch hiervoor bent, meldt u dit dan van tevoren bij de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft iedereen dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt op de afdeling Radiologie uitgevoerd door een radioloog, een radioloog in opleiding of een gespecialiseerd echo-laborant. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

In de echografiekamer ligt of zit u op een onderzoekstafel. Het gewricht wordt met echografie in beeld gebracht. Vervolgens wordt de plaats van de injectie gedesinfecteerd met een vloeistof (chloorhexidine). Er wordt met een dunne naald in het gewricht geprikt. Met de echo wordt gekeken of de naald goed zit. Als de naald op de juiste plek zit, wordt de vloeistof ingespoten. Daarna wordt de naald weer verwijderd. Er wordt een pleister op het wondje geplakt.

Na het onderzoek

- U mag zelf de eerste 24 uur geen voertuig besturen.
- U kunt verder uw dagelijkse activiteiten weer hervatten. Alleen als u veel pijn heeft of als het niet lukt, dan moet u dit niet forceren.

Dagboek

Na het onderzoek raden wij u aan, met name bij een prik in het heupgewricht, om een soort dagboek bij te houden waarin u noteert of de klachten verminderd of verdwenen zijn en of uw klachten veranderen bij activiteiten of in rust. Het is belangrijk om te weten hoe lang de klachten zijn verminderd of verdwenen.

Controle-afspraken

Na 4 tot 6 weken heeft u een afspraak op de polikliniek Orthopedie. De orthopeed bespreekt met u of de injectie geholpen heeft. Als er met u nog geen afspraak is gemaakt, belt u dan naar de polikliniek Orthopedie, tel. (078) 652 32 70.

Bijwerkingen

In de eerste uren na het onderzoek kunt u het gevoel hebben door uw been te zakken of dat uw arm of been stijver of slapper aanvoelt. Schrikt u hier niet van. Dit is tijdelijk. Wel moet u erop letten dat u voorzichtig loopt, om niet te vallen.

Ook kan de injectieplaats een aantal dagen wat pijnlijk aanvoelen. Er kan een bloeding (blauwe plek) of een zwelling ontstaan.

Depo-medrol® heeft als bijwerking dat u plotseling een warm en rood gezicht kunt krijgen. Dit noemen we flushes. Ook dit is tijdelijk en niet gevaarlijk.

Als u suikerziekte heeft, kunnen uw bloedsuikers onregelmatig raken. Zodra uw bloedsuikers anders worden dan u gewend bent, neemt u dan contact op met de arts die momenteel uw suikerziekte controleert. Dit is meestal de huisarts of de internist.

Tot slot

Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Als u verhinderd bent voor dit onderzoek wilt u ons dan zo spoedig mogelijk bellen? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Vragen

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft, kunt u bellen naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90 of de polikliniek Orthopedie, tel. (078) 652 32 70. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website www.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2026
pavo 1340