

Gebroken radiuskop of radiushals

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Een breuk in de radiuskop of radiushals komt vaak voor. De radiuskop of radiushals zit bij de elleboog, in het spaakbeen. Het spaakbeen is het bot tussen de pols en de elleboog. Als behandeling krijgt u een drukverband of een compressiekous of een dubbele compressiekous. U krijgt ook een sling. Een sling is een soort mitella.



Samenvatting

- U heeft een kleine breuk in het spaakbeen ter hoogte van de elleboog.
- Deze breuk herstelt meestal goed.
- Een afspraak op de polikliniek is meestal niet nodig.
- Verwijderen na maximaal 1 week het drukverband en de sling.

- Begin met oefenen zodra uw het drukverband heeft verwijderd. Uw elleboog wordt dan niet stijf. Zie verderop in deze folder. U kunt deze informatie ook nalezen in de Virtual Fracture app:



Klik de advertentie weg die u ziet als u de qr-code scant. Daarna kunt u de app downloaden.

- Heeft u tijdens het herstel vragen of klachten? Bel dan de Breuklijn op (078) 652 32 59. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-12.00 uur.

De behandeling

Een gebroken radiuskop of radiushals komt vaak voor. U krijgt een drukverband of een compressiekous of een dubbele compressiekous. U krijgt ook een sling. Een sling is een soort mitella.

Week 1

- Verwijder de sling zodra uw elleboog niet veel pijn meer doet.
- Verwijder het drukverband of de compressiekous zodra uw elleboog niet veel pijn meer doet.

Tussen week 1 en 4

Begin met oefenen: buig, strek en draai uw arm. Stop als het pijn doet.

Tussen week 4 en 6

Beweeg uw elleboog normaal. Stop als het pijn doet.

Na 6 weken

U mag weer sporten.

Instructies

Volg de volgende instructies voor een zo goed mogelijk herstel.

- De sling en het drukverband, de compressiekous of de dubbele compressiekous houden uw arm in een prettige positie.
- Verwijder de sling, het drukverband, de compressiekous of dubbele compressiekous zodra uw elleboog niet te veel pijn meer doet. Meestal is dit na 1 week. U mag het drukverband, de compressiekous of de dubbele compressiekous eventueel ook nog in week 2 gebruiken.
- U kunt het drukverband zelf vervangen. U kunt dit kopen bij de drogist.
- Begin zo snel mogelijk uw elleboog te buigen en strekken. Uw elleboog wordt dan niet dik. Stop met oefenen als het dit te veel pijn doet.
- Verderop in deze folder staan oefeningen.
- Als u pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken. Gebruik maximaal 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg. Doe dit maximaal 7 dagen.

Sling aanleggen



Doe de sling om zoals op de foto te zien is

Herstel

- Een controleafspraak op de polikliniek is vaak niet nodig. Als u veel pijn heeft en die pijn niet minder wordt, bel dan de Breuklijn. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak.
- Meestal kunt u uw elleboog na 4 tot 6 weken weer helemaal strekken. Als u dat nog niet kunt na 6 weken, herstelt uw elleboog binnen enkele maanden.
- Verderop in deze folder staan oefeningen. Dit helpt u beter te herstellen. Als u na 6 weken nog veel last heeft van de elleboog, kunt u hulp van een fysiotherapeut vragen.

Oefeningen

Om te zorgen dat uw elleboog niet stijf wordt en u geen kracht verliest, moet u oefeningen doen.

Doe de oefeningen minstens 3 keer per dag.

- Doe elke oefening 10 tot 15 keer.
- Beweeg uw schouder niet mee tijdens de oefeningen.
- U kunt eventueel in warm water oefenen.
- Als het goed gaat, kunt u de oefeningen doen met een flesje water of een gewichtje in uw hand.

Buigen en strekken van de elleboog

Buig en strek de elleboog. U kunt met deze oefening na 1 week beginnen, als het niet te veel pijn doet.

Draaien van de elleboog

Houd de ellebogen in de zij en buig de armen. Draai de handen zodat u eerst in de handpalm kan kijken en daarna op de handrug kan kijken. U kunt met deze oefening na 1 week beginnen, als het niet te veel pijn doet.

Vragen?

Bel de Breuklijn, tel. (078) 652 32 59. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-12.00 uur.

Of kijk op www.asz.nl.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Disclaimer:

De afbeelding en tekst is met toestemming van het OLVG overgenomen.

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2025
pavo 1889