

Operatie aan een naar binnen gedraaid ooglid

Entropion

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U heeft een naar binnen gedraaid ooglid. Dit noemen we een entropion. De oogarts heeft met u besproken dat u hieraan geopereerd wordt. In deze folder leest u hier meer over.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Entropion

Bij een entropion rollen uw wimpers met uw onderooglid mee naar binnen toe. Hierdoor kunnen uw wimpers het hoornvlies beschadigen.

De meest voorkomende klachten zijn pijn, roodheid, irritatie, lichtgevoeligheid en zand gevoel in de ogen. Ook verminderd zicht kan een klacht zijn. Dit ontstaat door het krassen van de wimpers tegen het hoornvlies.

Als u weinig klachten heeft, hoeft u niet geopereerd te worden.

Een entropion ontstaat meestal door het ouder worden. Daardoor verslappen de weefsels van het onderooglid. Soms ontstaat entropion bij iemand die er aanleg voor heeft en extra hard knijpt met de oogleden bijvoorbeeld door oogirritatie.

Vorbereidingen

Medicijngebruik

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit altijd melden aan de oogarts. De oogarts bespreekt met u of en hoelang voor de operatie u tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Ook het gebruik van pijnstillers moet worden gemeld omdat sommige pijnstillers een bloedverdunnende werking hebben.

Overige voorbereidingen

Op de dag van de operatie mag u geen make-up en/of gezichtscrème gebruiken.

Vervoer naar huis

U mag de eerste 24 uur na de operatie zelf geen voertuig besturen. We raden u aan om te regelen dat iemand u komt ophalen.

De operatie

Een onderooglid operatie wordt op de polikliniek Oogheelkunde op locatie Zwijndrecht gedaan.

Voor de operatie wordt u plaatselijk verdoofd. De oogarts maakt een snee onder uw ooglid. Er wordt een stukje ooglid verwijderd waarna het ooglid strakker wordt. Ook worden er speciale hechtingen geplaatst. De hechtingen zorgen ervoor dat uw ooglid weer naar buiten kantelt. De operatie duurt ongeveer een half uur.

Ruim 90% van de mensen die deze operatie heeft ondergaan vindt het resultaat goed.

Na de operatie

U krijgt zelf mee, die u twee keer per dag voorzichtig op de wondjes mag aanbrengen om een goede wondgenezing te bevorderen.

De klachten zoals pijn, irritatie, roodheid, zandgevoel zullen snel verdwijnen. Er kan een bloeduitstorting na de behandeling zichtbaar zijn. Dit trekt geleidelijk aan weg.

De eerste dagen kan er bij de hechtingen wat zwelling ontstaan. Dit trekt vanzelf weer weg.

In de eerste week na de operatie kan er wat afscheiding of ingedroogd wondvocht in uw buitenooghoek komen. Dit is niet erg. Een infectie komt zelden voor na deze behandeling. Dep voorzicht met lauwwarm water de afscheiding weg.

Na één week worden de hechtingen verwijderd op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Het litteken is na enkele weken vrijwel niet meer zichtbaar.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde.

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Oogheelkunde, belt u naar tel. (078) 654 12 33.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Deze folder is gebaseerd op de patiënteninformatie van www.oogartsen.nl en www.oogziekenhuis.nl. Als meer informatie wilt kunt op deze websites kijken. De tekst is aangepast aan de situatie in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2020
pavo 1336