

# Flaporen

Behandeling door de plastisch chirurg

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

# informatie

# Inleiding

Flaporen of afstaande oren komen regelmatig en worden veroorzaakt door een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. De plastisch chirurg kan dit corrigeren. Een flapoorcorrectie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar.

## Vorbereiding op de operatie

Het is belangrijk dat u vóór uw operatie een haarband koopt. Een haarband (of sportband/zweetband) kunt u meestal bij een sportwinkel vinden. De haarband is nodig om de oren te beschermen nadat het verband verwijderd is. Meer hierover leest u onder het kopje 'Na de operatie'.

Wij adviseren de haarband te kopen vóór de operatie, zodat u deze kunt passen. Na de operatie heeft u namelijk verband om uw oren. Deze band hoeft niet heel strak te zitten.

### Medische fotografie

Voorafgaand aan de operatie, laat u een foto maken bij de medisch fotograaf. Dit is nodig om de uitgangssituatie vast te leggen.

Hiervoor maakt de polikliniekassistent een afspraak voor u of u doet dit zelf. Ongeveer een ½ jaar na de ingreep kunt u een foto laten maken van het eindresultaat. Meer informatie leest u in de folder 'Medische fotografie'.

### Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

## Plaatselijke verdoving of narcose

Het rechtzetten van flaporen kan onder plaatselijke verdoving of onder narcose worden uitgevoerd. Dit hangt af van uw leeftijd en/of voorkeur. De plastisch chirurg bespreekt dit vooraf met u.

- Als de operatie poliklinisch **onder plaatselijke verdoving** wordt gedaan, verblijft u minimaal 2 uur op onze polikliniek.
- Als u **onder narcose** wordt geopereerd, wordt u een aantal uren opgenomen in het ziekenhuis. U mag u dezelfde dag weer naar huis. U krijgt dan voor uw operatie nog wel een gesprek met de anesthesioloog en de intakeverpleegkundige. De verpleegkundige geeft u informatie over uw opname op een verpleegafdeling in het ziekenhuis.

## De operatie

Bij de operatie wordt een snede aan de achterkant van uw oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt opnieuw in model gebracht en eventueel met een blijvende hechting vast gezet. Het stukje huid dat aan de achterkant van uw oor overblijft (doordat het oor dichtert tegen uw hoofd komt), wordt verwijderd.

# Weer naar huis

- Na de operatie krijgt u een strak verband om uw hoofd, de zogeheten tulband. Dit verband moet gemiddeld een week blijven zitten. Als het verband niet goed blijft zitten moet u contact opnemen met het ziekenhuis (zie onder: 'een arts waarschuwen').
- Wij raden u aan om de eerste week rustig aan te doen. U mag niet sporten.
- Als u pijn heeft, mag u pijnstillers innemen zoals paracetamol.
- U mag uw haar pas wassen als het verband verwijderd is.

## Controle

De week na uw operatie komt u voor controle terug bij de verpleegkundige op de polikliniek Plastische Chirurgie. Zij verwijdert het verband, controleert de wond en verwijdert zo nodig de hechtingen. De hechtingen zijn meestal oplosbaar.

### Haarband meenemen

De haarband die u voor de operatie heeft gekocht, neemt u mee naar uw afspraak met de verpleegkundige. Zodra het verband is verwijderd, wordt de haarband omgedaan om uw oren te beschermen.

### Hoe lang draagt u de haarband?

De plastisch chirurg spreekt met u af hoe lang de haarband moet dragen. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van leeftijd, activiteiten en arts.

- Of u draagt uw haarband na het eerste polikliniekbezoek nog 1 week dag en nacht. In de derde en vierde week na de operatie draagt u de haarband alleen 's nachts.

- Of u draagt uw haarband 6 maanden alleen 's nachts. Als u aan contactsporten doet, is die periode maximaal 1 jaar.

## Een arts waarschuwen

Het is nodig dat u een arts waarschuwt:

- Als de wond fors gaat bloeden.
- Bij toenemende pijn.
- Bij optreden van abnormale zwelling.
- Als u koorts heeft boven de 38,5°C of koude rillingen.
- Als het verband extreem gaat jeuken, gaat ruiken of uitslag veroorzaakt, of als het niet goed blijft zitten.
- Bij ongerustheid.

**Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur** belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66.

**'s Avonds en in het weekend** belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, tel. (078) 652 32 10. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastische chirurg.

## Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar geen perfectie.

Door de stugheid van het kraakbeen, heeft het oor soms de neiging om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm.

Dat uw oren geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit worden gegarandeerd. Een enkele keer is het nodig om nog een aanvullende correctie uit te voeren.

Het eerste jaar na de operatie zullen uw oren extra gevoelig zijn bij koud weer. Dit verdwijnt meestal vanzelf weer.

## **Risico's en complicaties**

Bij elke operatie kunnen complicaties voor komen zoals bloeduitstortingen, vertraagde wondgenezing of infectie.

Na de operatie komt er een litteken achter uw oor. Er bestaat een risico op hypertroof (overmatig) littekenweefsel. Hierdoor kan een aanvullende behandeling nodig zijn.

## **Vergoeding**

De kosten voor een correctie aan uw oren worden alleen vergoed als er sprake is van een medische indicatie en uw verzekering deze kosten vergoed. De verzekeraars hebben verschillende criteria voor de medische indicatie. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan of de operatie wordt vergoed.

Als de plastisch chirurg vindt dat er een medische indicatie voor de correctie is, zal de aanvraag bij uw verzekering worden gedaan. Na gemiddeld 3 tot 4 weken krijgt u de goedkeuring of afwijzing thuisgestuurd.

Als er geen medische redenen bestaan voor de operatie, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

# Tot slot

In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de nabehandeling. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij u niet geven. Complicaties kunnen altijd optreden.

Ook komt deze beschrijving niet in plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag.

*Tip:*

*Het is handig voor uzelf om deze folder mee te nemen wanneer u wordt behandeld. U kunt dan alle relevante informatie nog eens nalezen.*

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)



Nederlandse Vereniging  
voor Plastische Chirurgie  
HANDCHIRURGIE, RECONSTRUCTIEVE EN ESTHETISCHE CHIRURGIE

**Verantwoording tekst**

*De informatie is gebaseerd op voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie; Patientefolders - Flaporen*

Albert Schweitzer ziekenhuis  
maart 2021  
pavo 0723