

Cupfeeding

Bijvoeding voor uw baby bij Rhen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Er kunnen redenen zijn om uw baby naast borstvoeding, bijvoeding te geven. Bij Rhena wordt bijvoeding per cup gegeven. Dit wordt cupfeeding genoemd. Als uw baby wordt overgeplaatst naar de Kinderafdeling, wordt bijvoeding op een andere manier gegeven.

In deze folder leggen we uit wanneer cupfeeding nodig is, wat het precies is en wat u voor cupfeeding nodig heeft.

Wanneer is cupfeeding nodig?

- U bent bevallen na een zwangerschap van 35 weken en voor de 37^e week van de zwangerschap.
- Het bloedsuikergehalte van uw baby is te laag.
- Uw baby is meer dan zeven procent van zijn geboortegewicht afgevallen.
- Op advies van de kinderarts.

Wat heeft u nodig?

- Een spuugdoek.
- Een cup, een medicijnbekertje of kopje. De rand moet glad en vrij dun zijn.
- Voeding, het liefst afgekolfd borstvoeding. Als u dit niet heeft, kunt u ook kunstvoeding gebruiken. Kunstvoeding wordt vaak 'flesvoeding' genoemd.

Hoe geeft u cupfeeding?



- Zorg er voor dat uw baby goed wakker is.
- Houd uw baby rechtop op uw schoot en ondersteun zijn hoofd.
- Houd het cupje in uw dominante hand, als u rechts bent houdt u het cupje in uw rechterhand
- Wikkel uw baby in als hij erg onrustig is. Zo kunnen zijn handen niet tegen de cup stoten.
- Laat de cup licht rusten op de onderlip van uw baby
- Houd de cup schuin, dan kan uw baby er met zijn tong bij. **Giet geen melk in de mond**, maar laat uw baby het in zijn eigen tempo met zijn tong oplikken.
- Laat uw baby tussendoor rusten, **zonder** de cup weg te nemen.
- Laat uw baby boeren als hij de cup leeg heeft.
- Schrijf op de babylijst die bij het wiegje hangt, hoeveel voeding u heeft gegeven en de manier waarop.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2019
pavo 1026