

Myocardscintigrafie

Informatie in het Arabisch

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

انتبه! تحضير خاص

لا يسمح لك 24 ساعة قبل الفحص بتناول الكافيين. حيث أنه يمكن أن تكون نتيجة الفحص غير موثوقة بسبب الكافيين.

أمثلة على منتجات تحتوي على الكافيين أي لا يسمح بتناولها:

- القهوة (كذلك الخالية من الكافيين).
- الشاي (جميع الأنواع).
- الكولا (بدون أي نوع).
- الشوكولاته أو الحليب بالشوكولاته او المنتجات الأخرى التي تحتوي على الشوكولاته.
- مشروبات الطاقة (مثل ريد بول).
- الباراسيتامول الذي يحتوي ككافيين.

يسمح لك في صباح الفحص بتناول إفطار خفيفا في المنزل، مثل بسكويتة وقدحا من العصير. كما لا يسمح لك بتناول الكافيين.

إذا أكلت أو شربت على الرغم من ذلك شيئا يحتوي على الكافيين، لا يمكن أن يتم الفحص. يتم وضعك من جديد على لائحة الانتظار من أجل موعد جديد.

مقدمة

لديك قريبا موعد من أجل التصوير الومضاني لعضلة القلب. تقرأ في هذا المنشور المزيد حول ذلك.

هدف البحث

يمنح التصوير الومضاني لعضلة القلب معلومات حول تدفق الدم وحركة الجدران ووظيفة ضخ عضلة قلبك بعد الجهد وأثناء الراحة.

التحضير

- يمكن ان يؤثر الكافايين على نتيجة الفحص. لا يسمح لك 24 ساعة قبل الفحص بتناول الكافايين. للمزيد من المعلومات: أنظر الإطار الرمادي في مقدمة المنشور.
- يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على نتيجة هذا الفحص. يخبرك أخصائي أمراض القلب أو طبيبك المعالج أي من الأدوية لا يسمح لك باستخدامه مؤقتا. يجب عليك من أجل جميع الأسئلة حول استخدامك للأدوية الاتصال بالعيادة الخارجية للأخصائي المعالج الخاص بك. خذ هذه الأدوية معك إلى المستشفى لكي يمكنك تناولها بعد الفحص مباشرة.
- إذا كنت تستخدم (persantin (dipyridamol)، يجب عليك التوقف عنه قبل 48 ساعة من الفحص. اتصل من أجل ذلك بالأخصائي المعالج الخاص بك.
- يسمح لك في صباح الفحص بتناول إفطار خفيف، مثل بسكويتة وقدحا من العصير. انتبه: لا يسمح لك الآن كذك بتناول الشاي أو القهوة أو الكولا أو الحليب بالشوكولاته أو مشروب الطاقة.
- يجب عليك أثناء الفحص قيادة دراجة هوائية واستخدام جهاز مشي. ننصحك لذلك بارتداء ملابس وأحذية مريحة.
- ننصحك بعدم ارتداء سلاسل في يوم الفحص لأنها ستشكل إعاقة.
- خذ أدويةك أو علب أدويةك معك إلى الفحص.
- إذا كنت مصابا بداء السكري اتصل عندئذ مسبقا بقسم الطب النووي. يتم عندئذ إبلاغك بالتحضيرات الضرورية اللازمة.

الحمل أو الرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملا أو تظنين أنك حامل أو كنت تمنحين الرضاعة الطبيعية اتصلي عندئذ مسبقا بقسم الطب النووي. يتم عندئذ إبلاغك إن كان الفحص سيجري أم لا.

الفحص

الشعور

نحاول بأفضل ما يمكن الإشارة إلى ما يمكنك توقعه من عدم الراحة أو الألم عند إجراء فحص لك. لكن يشعر كل شخص على الرغم من ذلك به بطريقة الخاصة. أبلغنا إن كنت متخوفا من شيء أو كنت غير مطمئن، يمكننا عندئذ الأخذ بذلك بعين الاعتبار بشكل إضافي.

فحص الجهد

يدخل موظف طب نووي قسطارا وريديا في وريد في ذراعك. ثم تذهب إلى غرفة أخرى، حيث يطلب الموظف منك تعرية النصف الأعلى من جسمك. إذا كنت ترتدين حمالة صدر، يمكنك البقاء مرتدية لها. يضع الموظف لصقة ECG على صدرك قبل عمل تخطيط القلب. تكون أثناء فحص الجهد مربوطا بناشة ECG حيث تتم مراقبة نبض قلبك. يتم كذلك قياس ضغط دمك لعدة مرات أثناء الفحص.

يبدأ فحص الجهد بفحص دراجة هوائية. إذا لم تكن قادرا على ركوب الدراجة الهوائية، تُمنح دواء (persantin أو regadenoson) عبر القسطار الوريدي. يوسع هذا الدواء الشرايين التاجية و يجعل الجهد الجسدي يستمر أكثر.

يتم أثناء في لحظة الجهد الأقصى أو بعد منح perstatin أو regadenoson حقن كمية قليلة من السائل المشع عبر القسطار الوريدي في ذراعك. لا تلاحظ شيئا من ذلك. يجب عليك بعد حقن هذا السائل الاستمرار بقيادة الدراجة الهوائية لمدة دقيقة واحدة في فحص الدراجة الهوائية.

لغرض جعل امتصاص عضلة القلب للسائل المشع يتم بشكل أمثل، يجب عليك الانتظار نصف ساعة على الأقل قبل أخذ الصور باستخدام كاميرا جاما. تُمنح في هذه الفترة قدحا من الحليب وقطعة من كعك الإفطار مع الزبدة. يؤدي ذلك إلى ألا تشوش المرارة والأمعاء الصورة. ثم يجب عليك شرب قدحين من الماء قبل التصوير. يمكنك عمل ذلك فقط عند طلب الموظف ذلك منك.

يستغرق أخذ الصور نصف ساعة تقريبا. يكون النصف الأعلى من جسمك عاريا أثناء عمل الصور.

نصيحة: ارتد في يوم الفحص ملابس يكون كميتها واسعين. حيث يتم وضع قسطار وريدي في ذراعك ويمكنك خلع الملابس وارتدائها بشكل أسهل بعض الشيء.



الجهاز الذي يتم عمل الصور من خلاله.

فحص الراحة

يتم إجراء فحص الراحة بعد عدد من الساعات بعد صور الجهد. يحدث ذلك بنفس طريقة فحص الجهد، لكن بدون دراجة هوائية. تتم إزالة القسطار الوريدي بعد حقن السائل المشع. كما تُمنح حلبيبا وكعكة إفطار وماء قبل إجراء التصوير.

يستغرق الفحص 5 ساعات تقريبا. تبقى في المستشفى خلال هذا الوقت. يجري موظف طب نووي الفحص.

كاميرا جاما

يسمى الجهاز الذي يتم عمل الصور من خلاله بكاميرا جاما. لا تستلقي في نفق. يمكن من خلال السائل المشع جعل قلبك مرئيا لكاميرا جاما. السائل المشع ليس خطرا على محيطك. من المهم أثناء عمل الصور أن تكون تستلقي بسكون وأن تتنفس بهدوء. يمكنك كذلك العثور على المزيد من المعلومات على موقع قسم الطب النووي على www.asz.nl

بعد الفحص

يختفي السائل المشع من جسمك خلال 24 ساعة. يتم إرسال نتيجة الفحص إلى الأخصائي الخاص بك والذي طلب الفحص. ويناقش تناقش النتيجة معك.

في الختام

نبدل جهدنا لمساعدتك في الوقت المحدد بقدر الإمكان. نرجو منك لذلك الحضور في الوقت المحدد من أجل الفحص. إذا لم تستطع الحضور، يرجى الاتصال بنا هاتفيا بأسرع وقت ممكن. يمكن عندئذ إلغاء السائل المشع الذي تم طلبه لك.

هل لديك أسئلة بعد قراءة المنشور؟ اتصل عندئذ بلا تردد من الإثنين حتى الجمعة ما بين الساعة 16.30-08.00 بقسم الطب النووي، موقع نوردايك 0786523290. تسعدنا مساعدتك أكثر.

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2023
pavo 1790