

Huidtransplantatie op onderbeen

Behandeling door de plastisch chirurg

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Binnenkort wordt een huidafwijking op uw onderbeen verwijderd. De wond die daarbij ontstaat wordt gesloten met een huidtransplantaat. Dit is nodig omdat de wond die ontstaat te groot is om de wondranden te kunnen hechten. Het stukje huid dat hiervoor nodig is, wordt elders op uw lichaam weggehaald. Dit gebeurt tijdens dezelfde operatie.

In deze folder leest u meer over de behandeling en de periode daarna.

Vorbereidingen

- U mag op de dag van uw operatie eten en drinken zoals u gewend ben.
- Wij raden u aan op de dag van uw operatie in de ochtend te douchen of in bad te gaan.
- Na uw operatie krijgt u een verband om uw been en voet. We raden u aan makkelijke kleding te dragen, met bijvoorbeeld wijde pijpen en ruime schoenen.
- Zorg voor vervoer naar huis! U mag zelf niet lopen of langdurig staan. Als u komt, kunt u bij de ingang van het ziekenhuis alvast een rolstoel meenemen voor na uw operatie.
- Regel tijdig hulp voor thuis. Zie ook het kopje 'Na de operatie'.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De operatie

Vóór de operatie vertelt uw behandelend arts hoe de operatie zal verlopen. Hij bespreekt ook op welke plek het huidtransplantaat wordt afgenomen. Die plek heet de *donorplaats* en het stukje huid *donorhuid*. Dit zit meestal op het bovenbeen.

Rond de huidafwijking en de donorplaats krijgt u meerdere verdovingsprikken.

Als eerste wordt de huidafwijking verwijderd. Dit weefsel wordt opgestuurd voor microscopisch onderzoek.

Daarna neemt de arts huid af van de donorplaats. Dit gebeurt met een elektrisch apparaat. Hierdoor ontstaat een schaafwond.

De donorhuid wordt gebruikt om de wond op uw onderbeen te sluiten. De nieuwe huid wordt vastgemaakt met hechtingen of nietjes. Het wordt op zijn plaats gehouden (gefixeerd) met een sponsje. U krijgt daarna een drukverband om uw onderbeen en voet.

De donorplaats op uw bovenbeen wordt verbonden met een verband en pleister.

Na de operatie

Gedurende de eerste dagen na de operatie, vindt er ingroei plaats van kleine bloedvaatjes. Lukt deze ingroei, dan zal het transplantaat overleven.

Er mag geen zwelling ontstaan in uw onderbeen. Houdt u zich daarom in de eerste week aan de volgende punten:

- Hou uw been omhoog (minstens op heuphoogte).
- U mag alleen lopen en staan om naar toilet te gaan.

- Gebruik eventueel een rolstoel bij langere afstanden.
- Houd de verbanden droog en vervang ze niet.

Dit betekent dat u thuis hulp nodig heeft, bijvoorbeeld van uw partner, familie, vrienden, buren of thuiszorg.

Een arts waarschuwen

U waarschuwt een arts:

- Als de wond fors gaat bloeden of het verband gaat lekken.
- Bij toenemende pijn.
- Bij een abnormale zwelling.
- Als u koorts heeft boven de 38.5°C of koude rillingen.
- Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken.
- Bij ongerustheid.

Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66.

's Avonds en in het weekend belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (078) 652 32 10. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastisch chirurg

Controle op de polikliniek

Na ongeveer vijf tot zeven dagen komt u voor controle terug bij de verpleegkundige op de polikliniek Plastische Chirurgie. Als de uitslag van het microscopisch onderzoek dan al bekend is, krijgt u dit te horen.

De verpleegkundige verwijdert het sponsje van het huidtransplantaat en verbindt uw been opnieuw.

Zij controleert ook het verband op de donorplaats en vervangt dit zo nodig. Het herstel hiervan duurt ongeveer twee tot drie weken.

Afhankelijk van de genezing, maken we verdere afspraken met u. Meestal betekent dit:

- Dat u nog één week met uw been omhoog moet zitten.
- Dat u iets meer mag lopen, maar nog geen lange afstanden.
- Dat u het verband nog steeds droog houdt en/of vervangt als dit met u is afgesproken.
- Dat u een vervolgspraak krijgt op de polikliniek voor wondverzorging.

Littekens

Het doel van de operatie is het totaal verwijderen van de huidafwijking. Daarbij streeft de arts natuurlijk naar het beste cosmetische resultaat. Toch houdt u littekens aan deze operatie over. Deze worden uiteindelijk wel minder zichtbaar.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust tijdens kantooruren naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
november 2020
pavo 1322