

Behandeling van ijzertekort

Met een Ferinject-infuus

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Zoals de specialist met u heeft besproken, is uit onderzoek gebleken dat uw lichaam een ijzertekort heeft. Behandeling met tabletten heeft bij u niet het gewenste resultaat opgeleverd. De specialist heeft daarom voorgesteld om via een infuus een ijzerpreparaat bij u toe te dienen.

In deze folder leest u meer over de behandeling met Ferinject.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Wat is Ferinject?

Ferinject is een ijzerpreparaat dat ijzertekorten in het lichaam snel aanvult. Het wordt gebruikt:

- Bij ernstige bloedarmoede door een tekort aan ijzer.
- Om ijzertekort te voorkomen bij bepaalde aandoeningen waar snel een ijzertekort kan ontstaan (bijvoorbeeld bij nierdialyse).

Hoe wordt Ferinject toegediend?

Ferinject wordt via een infuus in een bloedvat van uw arm gegeven. De opname op de Dagbehandeling duurt ongeveer 1½ tot 2 uur. Het inlopen van het infuus duurt 30 minuten tot 1 uur. Daarna moet u nog een half uur blijven in verband met eventuele bijwerkingen.

De arts houdt bij de bepaling van de dosering rekening met uw leeftijd, gewicht en de ernst van het ijzertekort.

Het geven van de Ferinject is pijnloos. Gemiddeld genomen merkt u binnen 1 tot 2 weken het effect van de behandeling, zoals een afname van uw vermoeidheid.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van Ferinject komen weinig voor. Zeg het de verpleegkundige of arts als u last krijgt van één van onderstaande of andere klachten.

De volgende bijwerkingen kunnen *soms* optreden:

- Pijn op de plaats van toediening.
- Hoofdpijn.
- Duizeligheid.
- Maag-darmklachten, waaronder misselijkheid.
- Buikpijn en verstopping.
- Huiduitslag.

De volgende bijwerkingen treden *zelden* op:

- Ernstige allergische reactie met benauwdheid.
- Hartkloppingen.
- Duizeligheid door lage bloeddruk.
- Jeuk.
- Rillerigheid.

De bijwerkingen zijn meestal direct na toediening van de Ferinject merkbaar. Allergische reacties kunnen ook na enkele uren tot 4 dagen na de toediening nog ontstaan.

Dit is te merken aan pijn in uw spieren en gewrichten en soms koorts. Dit verdwijnt meestal na 2-4 dagen.

Het wel of niet hebben van bijwerkingen is niet van invloed op de werking van het medicijn. Het Ferinject-infuus bevat een hoge dosering ijzer. We raden u daarom aan om in de periode dat u met Ferinject behandeld wordt, geen ijzertabletten in te nemen.

Een arts waarschuwen

Bij ernstige bijwerkingen of allergische reacties belt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00- 16.30 uur naar de polikliniek van uw behandelend arts, via tel.(078) 6541111.

Bij acute zaken 's avonds en in het weekend belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (078) 652 32 10.

Controle

Na een of meerdere toedieningen van het infuus heeft u een afspraak voor controle op de polikliniek. De specialist bespreekt dan het effect van deze behandeling met u en maakt zo nodig afspraken voor verdere behandeling met Ferinject.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de verpleegkundige of specialist van de afdeling of polikliniek waar u onder behandeling bent. Via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis kunt u zich door laten verbinden, tel. (078) 654 11 11. De poliklinieken zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Geef hier u mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2021
pavo 0406