

Implantaten

Polikliniek Kaakchirurgie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U heeft gekozen voor één of meerdere implantaten in uw kaak. In deze folder leest u meer over de behandeling en de periode na de behandeling. Het inbrengen van implantaten wordt gedaan op locatie Dordwijk.

Wat zijn implantaten?

Implantaten zijn 'kunstwortels'. Een implantaat kan in de kaak geplaatst worden om een gebitsprothese meer steun te geven of ter vervanging van een verloren gegane tand of kies.

Vorbereiding

Foto maken

De keuze voor een implantaat gaat altijd in samenwerking met uw tandarts. Er wordt eerst een röntgenfoto gemaakt van uw gebit/kaken. De kaakchirurg kan op deze foto beoordelen of uw kaak geschikt is voor een implantaat.

Machtiging aanvragen

- Als uw onbetande (onder)kaak geschikt is voor *meerdere implantaten*, vraagt de kaakchirurg bij uw ziektekostenverzekeraar een machtiging voor deze behandeling aan. De zorgverzekeraar vergoedt alleen onder bepaalde voorwaarden. De aanvraag kan ongeveer zes tot acht weken duren. Zodra de kaakchirurg de machtiging heeft ontvangen, maken we met u een afspraak voor de behandeling.
- Voor implantaten in betande kaken kan er geen machtiging worden aangevraagd. U ontvangt van ons vooraf een offerte en achteraf de factuur. Soms is er een gedeeltelijke vergoeding mogelijk. Omdat dit per verzekeraar verschilt, raden we u aan om vooraf uit te zoeken hoe dit bij úw verzekeraar geregeld is.

Verdere voorbereiding

- Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de kaakchirurg met u hoe u daar mee om moet gaan.
- Het is belangrijk dat uw lippen in goede conditie zijn. We raden u aan om gedurende een aantal dagen voor de behandeling de lippen regelmatig in te vetten. Dit vermindert de kans op kloofjes tijdens de behandeling.
- U spoelt uw mond gedurende één minuut met mondspoeling chloorhexidine:
 - 1) de avond voor uw behandeling
 - 2) én de ochtend van uw behandeling
 - 3) én een uur voor uw behandeling.

De spoelvloeistof is bij de drogist te verkrijgen. *Wilt u het flesje meenemen naar het ziekenhuis? Zo kunt u vlak vóór de ingreep nog een keer uw mond spoelen.*
- Op de polikliniek krijgt u voor de behandeling van ons een pijnstillertje.

De behandeling

Het inbrengen van de implantaten vindt poliklinisch plaats. Tijdens de behandeling dekken we uw hoofd en bovenlichaam af met een steriele doek. We adviseren u daarom niet te warme kleding aan te trekken.

De kaakchirurg geeft u een plaatselijke verdoving. Zodra de verdoving werkt, begint de behandeling. Uw tandvlees wordt geopend. Er wordt een gaatje in uw kaakbot geboord. Vervolgens wordt het implantaat in uw kaak geplaatst. Daarna wordt uw tandvlees gehecht.

Het aanbrengen van één of enkele implantaten duurt ongeveer dertig tot zestig minuten. Er wordt na het aanbrengen van de implantaten nog een röntgenfoto gemaakt. Soms wordt er ook tijdens de behandeling een röntgenfoto gemaakt.

Na de behandeling

Nadat de implantaten zijn ingebracht, kunt u het ziekenhuis verlaten. We adviseren u om de eerste 24 uur na deze behandeling zelf geen voertuig te besturen.

Pijn

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn hebben. U krijgt een advies voor een pijnstillertje mee. We raden u aan om met deze pijnstillertje te beginnen nog voordat de verdoving is uitgewerkt.

Zwelling

Na de behandeling kan uw wang en/of lip gaan zwellen. Dit is een normaal gevolg van de behandeling. Om de zwelling te beperken geven wij u direct ijs mee en kunt u meteen na thuiskomst een coldpack of een washandje gevuld met ijsblokjes tegen uw wang houden. We raden aan om een kwartier per keer te koelen. Vervolgens koelt u een kwartier niet en daarna weer wel. Dit houdt u vol totdat u gaat slapen.

De eerste twee tot drie dagen kan uw wang en/of lip flink gezwollen zijn. Na zeven tot tien dagen is de zwelling meestal verdwenen.

Eten en drinken

De eerste twee weken na de behandeling mag u alleen gemalen/vloeibaar voedsel gebruiken. Na twee weken kunt u zachte voeding proberen. Geleidelijk kunt u weer normaal voedsel gaan eten. *Het is erg belangrijk dat u zich hier aan houdt, omdat het implantaat goed moet vastgroeien in het bot.*

Roken

Om de wondgenezing én de ingroei van de implantaten te bevorderen, is het belangrijk dat u niet (meer) rookt. Als u wel rookt, heeft dit namelijk nadelige gevolgen voor de wondgenezing en ingroei van uw implantaten.

Mondhygiëne

Voor een snelle genezing van de wond is een goede mondhygiëne belangrijk.

- U kunt uw tanden en kiezen poetsen zoals u gewend bent, waarbij u wel wat voorzichtiger bent bij de wond.
- De eerste week moet u uw mond nog twee keer per dag spoelen met de voorgeschreven mondspoeling.
- Als u twee implantaten in uw onderkaak heeft gekregen, mag u gedurende één week uw onderprothese **niet** dragen.

Lichamelijke inspanning

Zware lichamelijke inspanning en sport zijn soms niet mogelijk. U voelt zelf het beste wanneer een bepaalde houding of activiteit tot klachten leidt. Bij een grote lichamelijke inspanning is de kans op een nabloeding groter.

Koorts

Na de behandeling kunt u wat verhoging hebben. Na drie tot vier dagen neemt de verhoging meestal af.

Een arts waarschuwen

We raden u aan om contact op te nemen met de polikliniek Kaakchirurgie als u last krijgt van:

- Koorts boven 38,5°C
- Een forse nabloeding
- Een toename van de zwelling en slikklachten vijf dagen na uw behandeling

Controle

Na uw behandeling krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek Kaakchirurgie.

- De eerste controle vindt ongeveer een week na de behandeling plaats.

- De kaakchirurg probeert uw prothese zodanig aan te passen, dat u uw prothese weer kunt dragen. Dit lukt niet in alle gevallen en is afhankelijk van de vorm van uw kaak en uw prothese.

Naar de tandarts

Als u een implantaat heeft gekregen ter vervanging van een tand of kies, moet het implantaat eerst volledig in uw kaak vastgroeien. Pas daarna kunt u bij uw tandarts een afspraak maken voor het maken van een kroon.

- Meestal kan bij een implantaat in de *onderkaak* na zes tot twaalf weken een kroon worden aangemeten.
- Bij een implantaat in de *bovenkaak* kan de kroon na ongeveer Vier tot zes maanden worden aangemeten.
- Als u twee implantaten in een *tandeloze onderkaak* heeft gekregen, mag u zes weken na de behandeling naar uw tandarts om een nieuwe prothese aan te laten meten. De kaakchirurg meldt u altijd nadrukkelijk wanneer het zover is.

Tot slot

In deze folder hebben wij u een algemeen beeld gegeven van het verloop van de behandeling en de periode hierna. Het kan zijn dat uw behandeling anders verloopt dan hier is beschreven. Wij stemmen uw behandelplan af op úw situatie.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust tijdens kantooruren naar de polikliniek Kaakchirurgie, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 33 10. We beantwoorden uw vragen graag.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen bellen naar de afdeling Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2018
pavo 0403