

# Nemen van biopten

Op de polikliniek Kaakchirurgie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**



# Inleiding

U bent door de tandarts of huisarts verwezen naar de kaakchirurg. De kaakchirurg gaat één of meerdere kleine stukjes weefsels verwijderen (= bipten nemen) voor microscopisch onderzoek. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

De behandeling vindt plaats op de polikliniek Kaakchirurgie op *locatie Dordwijk*.

## Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

# Vorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het nodig om voor de behandeling dit met de kaakchirurg te bespreken of u moet stoppen met de bloedverdunders. Met acetylsalicylzuur, ascal, aspirine en andere aspirineachtige medicijnen hoeft u meestal niet te stoppen. Hetzelfde geldt voor bloedverdunders die tot de zogenaamde NOAC's en de DOAC's behoren.

# De behandeling

U krijgt een plaatselijke verdoving. Zodra de verdoving werkt, worden één of meerdere stukjes weefsels uit uw mond verwijderd. De wondjes worden meestal gehecht.

Na de behandeling kunt u het ziekenhuis verlaten. Het verwijderde weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek.

## **Na de behandeling**

### **Verdoving**

U heeft een plaatselijke verdoving gekregen. Deze verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het advies is om na de behandeling zelf geen voertuig te besturen.

### **Nabloeding en zwelling**

Na de behandeling wordt er soms een gaasje op de wond gelegd. U moet een half uur het gaasje tegen het wondje aan drukken. Het dichtdrukken van de wond verkleint de kans op een nabloeding.

Na de behandeling kan uw tong, wang en/of lip gaan zwellen. Dit is een normaal gevolg van de behandeling. Om de zwelling te beperken kunt u direct na thuiskomst een coldpack in een theedoek of een washandje gevuld met ijsblokjes tegen uw wang houden. U kunt afwisselend 15 minuten wel en 15 minuten niet koelen. Dit blijft u doen tot u naar bed gaat.

De eerste 2 tot 3 dagen kan uw wang en/of lip flink gezwollen zijn. Na 7 tot 10 dagen is de zwelling meestal verdwenen.

### **Pijn**

Als de verdoving is uitgewerkt kunt u pijn hebben. U kunt daarvoor paracetamol innemen, volgens de op de verpakking aangegeven dosering.

## **Eten en drinken**

U mag na de behandeling gewoon eten en drinken.  
De eerste 24 uur na de behandeling mag u niet roken en geen alcohol gebruiken.

## **Mondhygiëne**

Voor een snelle genezing van de wond is een goede mondhygiëne belangrijk. U kunt uw tanden en kiezen gewoon poetsen, waarbij u wat voorzichtiger bent bij de wond. De eerste 24 uur mag u uw mond niet krachtig spoelen.

## **Normale bijverschijnselen**

- Enig nabloeden (1 tot 2 dagen)
- Zwelling (maximaal na 2 tot 3 dagen)
- Temperatuurverhoging (3 tot 4 dagen)
- Aanzienlijke pijn (ongeveer 7 dagen)
- Beperkte mondopening (tot ongeveer 10 dagen)
- Enige slikklachten of pijn bij het slikken.

## **Hechtingen**

De wond wordt meestal gehecht met oplosbare hechtingen. De hechtingen lossen in ongeveer 1 tot 3 weken op.

# **Een arts waarschuwen**

We adviseren u contact op te nemen met de polikliniek Kaakchirurgie als u last krijgt van:

- Koorts boven 39°C;
- Dat de wond fors gaat bloeden;
- Een forse toename van de zwelling en slikklachten.

Op werkdagen tussen 8.30-12.00 en 13.00-16.30 uur belt u naar de polikliniek Kaakchirurgie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, tel. (078) 652 37 71.

Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, tel. (078) 652 32 10. De afdeling Spoedeisende Hulp neemt dan contact op met de dienstdoende kaakchirurg.

## **Uitslag van het weefselonderzoek**

De uitslag van het weefselonderzoek is na ongeveer anderhalve tot twee weken bekend. U krijgt dan een telefonische of poliklinische afspraak. Bij een poliklinische afspraak controleert de kaakchirurg de wond en bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek maakt de kaakchirurg verdere afspraken met u.

## **Tot slot**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? De polikliniek Kaakchirurgie is op werkdagen van 08.00-12.00 en van 13.00-16.30 uur telefonisch bereikbaar, via tel. (078) 652 37 71. We beantwoorden uw vragen graag. Ook voor het maken of verzetten van een afspraak belt u naar dit nummer.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
juni 2024  
pavo 0402