

Blindedarmontsteking bij kinderen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie


Inleiding

Je bent opgenomen op de Kinderafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dit moest omdat je waarschijnlijk een blindedarmontsteking hebt. In deze folder leggen we je uit wat dat precies is. Het is goed om deze folder ook aan je ouders te geven. Zo kunnen zij ook lezen wat er aan de hand is.

Blindedarm

In je buik zitten allerlei organen. Eén van die organen zijn je darmen. Je hebt een dunne en een dikke darm. Tussen de dunne en dikke darm zit een klein stukje darm die je eigenlijk niet nodig hebt. Dit heet de blindedarm.

De blindedarm is zo groot als je pink. Soms raakt deze ontstoken. Dit noemen we een blindedarmontsteking.



Afb: Plaats van de dikke en dunne darm en de blindedarm (*).

Klachten

Iedereen kan een blindedarmonsteking krijgen. Dit merk je doordat:

- Je pijn hebt onder je navel. De pijn verplaatst zich vaak naar de rechter kant van je onderbuik.
- Je minder trek hebt in je eten. Je bent misselijk en soms moet je zelfs overgeven.
- Je koorts hebt.
- Je je niet lekker voelt.
- Je diarree hebt of je kunt niet poepen.

Opname

Op de afdeling Spoedeisende Hulp heeft de dokter naar je buik gekeken. Ook is er bloed geprikt. Soms wordt er ook nog een echo gemaakt. Nu ben je inmiddels opgenomen op de Kinderafdeling. Als de dokter nog niet zeker weet of je een blindedarmonsteking hebt, wordt er later nog een keer onderzoek gedaan.

Vorbereiding

Je mag een paar uur voor de operatie niet meer eten, drinken en roken.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat je kunt verwachten aan ongemak of pijn als je een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als je ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Operatie

De verpleegkundige brengt je naar de operatiekamer. Daar geeft de dokter je medicijnen. Dit kan via je infuus of via een kapje, zodat je in slaap valt en niets meer voelt. Dit noemen we narcose.

De dokter beslist op welke manier je je medicijnen krijgt. Als je dat wilt, mag je vader of moeder bij je blijven tot je slaapt.

Tijdens de operatie haalt de dokter de ontstoken blindedarm eruit. Dat kan via een kijkoperatie; je hebt daarna drie kleine wondjes op je buik. Soms kiest de dokter ervoor om een snee rechts onderin je buik te maken. De wondjes/snee worden dichtgemaakt met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen hoeven er later niet uit gehaald te worden, maar ze verdwijnen vanzelf.

Opeengebarsten blindedarm

Soms is de blindedarm opeengebarsten in je buik. Dat wordt ook wel een perforatie genoemd. Daardoor is de ontsteking in je buik gekomen. Je kunt hier erg ziek van zijn. Je moet dan drie dagen medicijnen (antibiotica) via het infuus krijgen. Afhankelijk van hoe het met je gaat, moet je hierna nog antibioticatabletten of -drank innemen.

Als de ontsteking in je buik is ontstaan, is een extra behandeling nodig. De dokter plaatst dan een drain. Een drain is een plastic slangetje dat er voor zorgt dat de viezigheid van de ontsteking je buik uit kan. De drain wordt eruit gehaald als er geen viezigheid meer uitkomt.

Na de operatie

Na de operatie wordt je naar de uitslaapkamer gebracht. Je ouders/verzorgers mogen erbij zijn als je wakker wordt. Zodra je wakker bent ga je weer terug naar de kinderafdeling. De verpleegkundige controleert regelmatig je hartslag, je bloeddruk en bekijkt de wond. Je hebt een infuus waardoor je vocht krijgt. Via het infuus kun je ook medicijnen krijgen.

Na de operatie mag je proberen te drinken. Als dat goed gaat, dan mag je ook wat eten.

Je kunt na de operatie nog buikpijn hebben. Je krijgt medicijnen tegen de pijn. Als je minder pijn hebt, kun je je beter bewegen. Daardoor word je sneller beter.

Meestal mag je één of twee dagen na de operatie weer naar huis.

Naar huis

Je krijgt een afspraak mee om terug te komen bij de dokter. Doe de eerste tijd rustig aan. Vraag aan de dokter wanneer je weer mag sporten en je weer naar school mag.

Het ziekenhuis bellen

Thuis moet het alleen maar beter gaan. Als je zieker wordt, kun je een infectie hebben. Je moet dat niet afwachten, maar gelijk (laten) bellen naar de polikliniek Chirurgie of de afdeling Spoedeisende Hulp.

Als je weer thuis bent en je krijgt last van:

- koorts (boven de 38,5°C) en/of
- buikpijn die erger wordt en/of
- de wond die dik en rood wordt.

Dan bel jij of je ouders naar het ziekenhuis op werkdagen tussen 08.00 -17.00 uur naar de polikliniek Chirurgie, tel. (078) 652 32 50.

Buiten kantooruren bel je naar de afdeling Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van het Albert Schweitzer ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11.

Tot slot

Heb je na het lezen van de folder nog vragen? Stel die dan gerust aan de dokter en de verpleegkundige. We helpen je graag verder.

De afbeeldingen in deze folder die gemerkt zijn met een ^() zijn afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com*



Deze folder is getest door een onafhankelijk patiëntenpanel

Albert Schweitzer ziekenhuis
Kinderafdeling
oktober 2018
pavo 0582