Laserbehandeling bij nastaar

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

albert schweitzer

Inleiding

U heeft een afspraak voor een poliklinische laserbehandeling om de nastaar weg te laseren.

Wat is nastaar?
Na een staaroperatie kan het kapselzakje, waarin de kunstlens zit, troebel worden. De gezichtsscherpte vermindert dan weer. We spreken in zo'n situatie van nastaar. De nastaar hoeft niet operatief verwijderd te worden. Het kan op de polikliniek gemakkelijk weggehaald worden met de zogeheten YAG-nastaar laser. Deze laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radio-activiteit.

Hoe snel nastaar ontstaat, verschilt per persoon. Dit varieert van weken tot jaren of soms helemaal niet.

De behandeling

Wat mag u van de behandeling verwachten?

- Uw ogen worden gedruppeld om uw pupillen wijder te maken. Deze moeten ongeveer 15-20 minuten inwerken.
- Het hoornvlies wordt soms verdoofd met oogdruppels. De behandeling doet dus geen pijn.
- U gaat op een stoel zitten achter het laserapparaat. U plaatst uw kin op een steun en leunt met uw voorhoofd tegen een band.
- Bij de behandeling wordt soms een glazen contactlensje op het hoornvlies geplaatst. Deze wordt vastgehouden door de oogarts. Hier voelt u niets van.
- Het is belangrijk dat u goed stil zit en recht vooruit kijkt.
- De behandeling duurt ongeveer 5 minuten per oog. Direct hierna kunt u een beetje wazig zien door de lichtflitsen en de druppels die u heeft gehad. Na een aantal uur wordt uw gezichtsvermogen weer als voorheen.

U mag na de behandeling zelf geen voertuig besturen!
Uw gezichtsvermogen is door de gebruikte medicijnen mogelijk verminderd. Neem daarom iemand mee naar het ziekenhuis die u na de behandeling naar huis brengt; ook als u met het openbaar vervoer of een taxi reist.

Klachten en complicaties

Bij iedere behandeling is er een kleine kans op complicaties. Deze kunnen bestaan uit:

- Een een lichte beschadiging van de kunstlens doordat de laserspot de lens aangeraakt heeft. Dit veroorzaakt zelden klachten met het zien.
- Een geringe ontstekingsreactie (afhankelijk van hoeveel lenskapsel verwijderd wordt). Dit kan behandeld worden met oogdruppels.
- De restanten van het achterste lenskapsel komen in de glasvochtruimte terecht (de ruimte achter de kunstlens). Deze troebelingen kunnen soms worden waargenomen als bewegende deeltjes (vlokjes, stipjes, sliertjes). Doordat het beeld ook helderder wordt, kunnen de troebelingen eerder opvallen. Vaak zakken de troebelingen naar beneden waardoor men er geen hinder meer van heeft.
- Mogelijk een minimaal verhoogd risico op een netvliesloslating. Sommigen studies laten een klein verhoogd risico zien, andere studies laten geen verhoogd risico zien.

Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor deze behandeling, wilt u dan zo spoedig mogelijk bellen met de polikliniek Oogheelkunde waar u de afspraak heeft? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde.
Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Oogheelkunde, belt u voor alle locaties naar tel. (078) 654 12 33.

Geef hier uw mening over deze folder:
www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
september 2026
pavo 1824