

Marcaïnisatie van de heup

Op de afdeling Radiologie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

In deze folder leest u meer over een marcaïnisatie van uw heupgewricht. Dit is een echografisch onderzoek waarbij een injectie in het heupgewricht wordt gegeven.

U heeft een afspraak

op: _____ dag _____ om _____ uur.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie **Dordwijk**.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Radiologie.

Doel van het onderzoek

Bij een marcaïnisatie wordt een vloeistof in uw heupgewricht gespoten. De injectievloeistof bestaat uit een mengsel van een verdovende vloeistof (Marcaïne®) en een ontstekingsremmer (Depo-medrol®). Door de injectie wordt het heupgewricht tijdelijk gevoelloos gemaakt (verdoofd). Dit wordt gedaan om te testen of de pijn die u nu heeft, wel of niet uit uw heup komt. Als de pijn vermindert of verdwijnt komen de problemen waarschijnlijk uit het heupgewricht. Als de pijn niet vermindert of verdwijnt, komt de pijn niet uit de heup, maar bijvoorbeeld uit uw rug.

Vorbereiding

Vervoer naar huis

Uw heup wordt tijdens het onderzoek verdoofd. U mag daarom de eerste 24 uur na het onderzoek zelf geen voertuig besturen. We raden u aan om te regelen dat iemand u komt ophalen.

Allergisch

Allergie voor Marcaïne[®] of Depo-medrol[®] is uiterst zeldzaam. Als u toch allergisch hiervoor bent, meldt u dit dan van tevoren bij de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt op de afdeling Radiologie uitgevoerd door een radioloog, een arts-assistent in opleiding of een gespecialiseerd laborant.

In de echografiekamer ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. Het heupgewricht wordt met echografie in beeld gebracht. Vervolgens wordt de plaats van de injectie gedesinfecteerd met een vloeistof (chloorhexidine). De arts prikt met een dunne naald in het heupgewricht. Met de echo wordt gekeken of de naald goed zit.

Als de naald op de juiste plek zit, wordt het mengsel van de twee vloeistoffen ingespoten. Daarna wordt de naald weer verwijderd. Er wordt een pleister op het wondje geplakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

U mag zelf de eerste 24 uur geen voertuig besturen.

U kunt verder uw dagelijkse activiteiten weer hervatten. Alleen als u veel pijn heeft of als het niet lukt, dan moet u dit niet forceren.

Als de pijn veroorzaakt wordt door een aandoening van het heupgewricht, zal de injectie vrij snel gaan werken. De werking kan enkele weken aanhouden.

Dagboek

Na het onderzoek raden wij u aan om een soort dagboek bij te houden waarin u noteert of de klachten verminderd of verdwenen zijn en of uw klachten veranderen bij activiteiten of in rust. Het is belangrijk om te weten hoe lang de klachten zijn verminderd of verdwenen.

Controle-afpraak

Na 4-6 weken heeft u een afspraak op de polikliniek Orthopedie. De orthopeed bespreekt met u of de injectie geholpen heeft.

Als er met u nog geen afspraak is gemaakt, belt u dan naar de polikliniek Orthopedie, tel. (078) 652 32 70.

Bijwerkingen

In de eerste uren na het onderzoek kunt u het gevoel hebben door uw been te zakken. De heup kan ook stijf aanvoelen. Schrikt u hier niet van. Dit is altijd tijdelijk. Wel moet u erop letten dat u voorzichtig loopt, om niet te vallen.

Ook kan de injectieplaats een aantal dagen wat pijnlijk aanvoelen. Er kan een bloeditstorting (blauwe plek) of een zwelling ontstaan.

Depo-medrol® heeft als bijwerking dat u plotseling een warm en rood gezicht kunt krijgen. Dit noemen we flushes. Ook dit is tijdelijk en niet gevaarlijk.

Als u suikerziekte heeft, kunnen uw bloedsuikers ontregeld raken. Zodra uw bloedsuikers anders worden dan u gewend bent, neemt u dan contact op met de arts die momenteel uw suikerziekte controleert. Dit is meestal de huisarts of de internist.

Tot slot

Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Als u verhinderd bent voor dit onderzoek wilt u ons dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Vragen

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren bellen naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90 of de polikliniek Orthopedie, tel. (078) 652 32 70.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website www.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
juni 2020
pavo 1340