

Abatacept (Orencia®)

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u het medicijn abatacept gaat gebruiken.

In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van abatacept

Bloed bestaat onder andere uit witte bloedcellen. Witte bloedcellen zijn een onderdeel van het afweersysteem van het lichaam. Ze spelen ook een rol bij het ontstaan van ontstekingen en gewrichtsschade bij reumatoïde artritis. De witte bloedcellen bestaan uit verschillende soorten cellen, bijvoorbeeld T-lymfocyten.

Abatacept is een eiwit waarmee de activiteit van de T-lymfocyten wordt onderdrukt. Hiermee wordt het ontstekingsproces tot rust gebracht.

Wanneer wordt abatacept gegeven?

Abatacept wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis.

Abatacept kan voorgeschreven worden aan patiënten waarbij andere medicijnen tegen reumatoïde artritis, waaronder tenminste één TNF-remmer, onvoldoende helpen.

Voorafgaand aan de behandeling met abatacept moet misschien nog een keer onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit betekent dat onder andere onderzocht wordt of u in het verleden een tbc-infectie of hepatitis heeft gehad.

Gebruik van abatacept

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

- Abatacept wordt via injecties gegeven. U leert hoe u dit zelf kunt doen (met een zogeheten prikpen). Dit moet meestal 1 keer per week gebeuren.
- Abatacept werkt snel, soms al na twee weken. Het duurt wel enkele weken voordat er voldoende resultaat is bereikt.
- Als blijkt dat u goed op het medicijn reageert, kan worden geprobeerd de periodes tussen de injecties te verlengen.
- Abatacept wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX).

Controle

Tijdens de behandeling met abatacept wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd.

Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Als u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met de abatacept injecties.

Bijwerkingen van abatacept

Hierna worden de meest voorkomende bijwerkingen beschreven:

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. We adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de reumaverpleegkundige.
- Abatacept geeft een grotere kans op infecties. Neem daarom de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een pussend wondje, contact op met uw huisarts of reumatoloog.
- Mogelijk is er een verhoogd risico op de ontwikkeling van kwaadaardige huidgezwellen. Bij het waarnemen van nieuwe vlekjes of veranderingen van vlekjes op de huid moet u dit doorgeven aan de reumatoloog.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinatie (griep prik) wordt aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts.

We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Reisadvies

We raden u af om bij gebruik van abatacept naar landen te reizen waar geen goede medische en hygiënische voorzieningen zijn. Wilt u dit toch, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Operaties

Er is een verhoogd risico op infecties na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u abatacept gebruikt. Als u een geplande operatie moet ondergaan, adviseren we u om tijdelijk geen abatacept meer te gebruiken. Zodra de operatiewond genezen is, mag u weer abatacept gaan gebruiken. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de tandarts of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van abatacept samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met abatacept. Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.

Vertel uw huisarts, tandarts en specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Vertel ook altijd bij uw apotheek dat u abatacept gebruikt.

Abatacept en diabetes

Sommige bloedsuikermeters kunnen op de dag van het abatacept-infuus een verkeerde uitslag geven door de maltose die in abatacept zit. Dit is bij meters die zijn gebaseerd op glucose dehydrogenase pyroloquinone (GDH-PQQ). U kunt dit nakijken op de verpakking of in de handleiding van uw meetsysteem.

Als u afwijkende bloedsuikers heeft, overleg dan met de arts die u insuline voorschrijft of u de dosering moet aanpassen.

Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van ReumaNederland, www.reumanederland.nl

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 -16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2020
pavo 0896