

Anakinra (Kineret®)

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u het medicijn anakinra gaat gebruiken.

In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van anakinra

In ons lichaam komen verschillende soorten eiwitten voor. Eén van deze eiwitten is IL-1 (interleukine 1). IL 1 speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en blijven bestaan van ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van te veel interleukine 1. Anakinra blokkeert de activiteit van interleukine 1 waardoor ontstekingsklachten afnemen.

Anakinra kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afneemt en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Wanneer wordt anakinra gegeven?

Anakinra kan voorgeschreven worden aan patiënten met een reumatische aandoening (zoals reumatoïde artritis) waarbij andere medicijnen onvoldoende helpen.

Voorafgaand aan de behandeling met anakinra moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt onder andere in dat onderzocht wordt of u een tbc-infectie of hepatitis heeft of heeft gehad.

Het gebruik van anakinra

- Anakinra wordt via injecties gegeven. U leert hoe u dit zelf kunt doen. Dit moet meestal één keer per dag.
- De werking van anakinra is meestal niet meteen merkbaar. Het kan soms al na twee weken merkbaar worden. Het duurt enkele weken tot drie maanden voordat er voldoende resultaat is bereikt.
- Anakinra wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX).

Controle

Tijdens de behandeling met anakinra wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd. Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Als u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met de anakinra injecties.

Bijwerkingen van anakinra

Hierna worden de meest voorkomende bijwerkingen beschreven:

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. We adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de verpleegkundig reumaverpleegkundige.
- Anakinra geeft een grotere kans op infecties. Neem daarom uw temperatuur op als u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een wondje waar pus uitkomt, contact op met uw huisarts of reumatoloog en wacht met de injectie.
- Mogelijk is er een verhoogd risico op de ontwikkeling van kwaadaardige huidgezwollen. Bij het waarnemen van nieuwe vlekjes of veranderingen van vlekjes op de huid moet u dit doorgeven aan de reumatoloog.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinatie (griep prik) wordt aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts.

We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van anakinra naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Operaties

Er is een verhoogd risico op infecties na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u anakinra gebruikt. Als u een geplande operatie moet ondergaan adviseren wij u om 2 maanden voor deze operatie geen anakinra meer te gebruiken. Zodra de operatiewond genezen is, mag u weer anakinra gaan gebruiken. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de tandarts of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van anakinra samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts over uw behandeling met anakinra.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
- Vertel bij uw apotheek ook altijd dat u anakinra gebruikt.

Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van ReumaNederland, www.reumanederland.nl

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2020
pavo 0911