

Antibiotica bij een gewrichtsprothese

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

De orthopeed heeft bij u een gewricht (deels) vervangen door een gewrichtsprothese. In sommige situaties moet u antibiotica gebruiken om de kans op infectie van de prothese te verminderen. In deze folder leest u hier meer over.

Antibiotica-profylaxe

Als u antibiotica gaat gebruiken ter voorkoming van een infectie noemen we dit antibiotica-profylaxe.

Mensen met een gewrichtsprothese lopen het risico dat de prothese, ook in de jaren na de operatie, kan ontsteken (infectie) doordat bacteriën via de bloedbaan op de prothese terechtkomen.

Een infectie van een prothese kan zeer nare gevolgen hebben. Soms moet de prothese zelfs verwijderd worden.

Als u een infectie ergens in uw lichaam heeft of als u vermoedt dat u een ontsteking krijgt, dan raden wij u aan om zo snel mogelijk naar uw huisarts te gaan. Als uw huisarts niet aanwezig is, gaat u naar een vervanger. Het kan nodig zijn om snel met antibiotica te starten om deze infectie te behandelen. Zo kan het risico van infectie via de bloedbaan van de prothese vaak voorkomen worden.

Ook als u geen ontstekingen heeft, is het soms nodig om bij sommige behandelingen vooraf antibiotica te slikken om het risico op infectie van de prothese te verminderen. Lang niet altijd is dat nodig. Vraag dat aan uw behandelend huisarts of tandarts.

Wanneer is antibiotica ook nodig?

U heeft vooraf antibiotica nodig bij:

- Alle operaties en diagnostische behandelingen als u een verminderde weerstand heeft.
- Behandelingen bij de tandarts als u een infectie in uw mond heeft.
- Cystoscopie (kijkonderzoek in de blaas) als u een urineweginfectie heeft.
- Endoscopie of endoscopische ingreep als er een infectie in het gebied aanwezig is, waar de ingreep plaatsvindt.

U vertelt tegen de arts of hulpverlener die u gaat behandelen dat u een gewrichtsprothese heeft. Als uw behandeling op een later moment plaatsvindt, krijgt u een recept voor antibiotica mee. De antibiotica haalt u bij uw apotheek. U neemt de antibiotica één uur voor de behandeling in.

Als u met spoed moet worden behandeld, regelt uw hulpverlener dat u direct antibiotica krijgt.

Wanneer is geen antibiotica nodig?

Als u een behandeling moet ondergaan waarbij er geen sprake is van een ontsteking, dan is antibiotica vooraf niet nodig. Ook al is er een kans op bijvoorbeeld een wondinfectie na de behandeling, dan nog is er vooraf geen antibiotica nodig.

Als u naar de tandarts of mondhygiënist gaat voor behandeling waarbij geen infectie in uw mond aanwezig is, is antibiotica vooraf ook niet nodig. Ook niet als u een verminderde weerstand heeft.

Hoe lang geldt deze voorzorg?

De adviezen die in de folder zijn beschreven gelden levenslang.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust tijdens kantooruren naar de polikliniek Orthopedie, tel. (078) 652 32 70.

Als uw hulpverlener vragen heeft over het voorschrijven van antibiotica, dan kan hij/zij uiteraard ook bellen met de polikliniek Orthopedie. In spoedgevallen buiten kantooruren, is ook altijd een orthofoon bereikbaar voor overleg.

Bronnen

Richtlijn Nederlandse Orthopaedische Vereniging - NTvG: 2008 18 oktober ;152 (42) 2282-2285

Richtlijn Nederlandse Orthopaedische Vereniging - Richtlijnmodule antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese ©2015

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2018
pavo 1410