

Centrale catheter via de arm (PICC)

Belangrijk

Komt u als patiënt in ons ziekenhuis, dan stellen we u de volgende vragen:

1. a Bent u besmet met MRSA of een andere BRMO (=ziekenhuisbacterie)?
b Is uw partner/huisgenoot of iemand die u verzorgt, besmet met MRSA?
2. Bent u afgelopen jaar opgenomen geweest in een buitenlandse zorginstelling en/of bent u woonachtig geweest in een opvanglocatie voor asielzoekers?
3. Bent u afgelopen jaar opgenomen geweest in een andere binnenlandse zorginstelling (m.u.v. Albert Schweitzer ziekenhuis) met een MRSA-/BRMO-probleem?
4. Komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?
5. Voor jongeren onder de 18 jaar: ben je afgelopen jaar geadopteerd uit het buitenland?
Dat doen we om het risico op besmetting met resistente* bacteriën uit te sluiten. Zo maken we onze zorg nog veiliger.

*Resistent = ongevoelig voor antibiotica

informatie

Albert
Schweitzer
ziekenhuis



Uw behandelend arts is: _____

U kunt uw arts tijdens kantooruren bellen via de polikliniek

_____, tel. (078) _____.

De oncologieverpleegkundige is bereikbaar via


tel. (078) _____

Inleiding

De arts heeft met u besproken dat u een centrale katheter via uw arm krijgt. In deze folder leest u meer over deze catheter.

Wat is een PICC?

PICC staat voor peripheral inserted central venous catheter. Dit betekent dat een heel lange infuuslijn wordt ingebracht via een bloedvat in de arm richting een groter bloedvat in uw borstkas. (Zie afbeelding 1)



Afbeelding 1

Waarom een PICC?

Als u een langdurige infuusbehandeling nodig heeft en het inbrengen van een infuus moeizaam verloopt, kan er gekozen worden voor het plaatsen van een PICC.

Via de PICC kunnen medicijnen gegeven worden zonder dat dit pijnlijk is. Ook kan bloed afgenomen worden zonder te prikken.

Wanneer krijgt u een PICC?

U krijgt een PICC als u:

- chemotherapie nodig heeft;
- langdurig antibiotica moet krijgen;
- er regelmatig ook bloedafnames nodig zijn.

Hoe wordt een PICC ingebracht?


De PICC wordt op de afdeling Intensive Care ingebracht. Op deze afdeling zijn alle materialen aanwezig die nodig zijn voor het inbrengen.

De arts zoekt met een echo apparaatje naar een geschikt bloedvat vlak boven uw elleboogsplooi. Meestal zal dit uw rechter arm zijn. Op deze plaats wordt uw huid verdoofd.

Er wordt met een naald in het bloedvat geprikt. Via deze naald wordt een draadje opgeschoven. Vervolgens wordt de infuuslijn daar weer overheen geschoven.

Na de ingreep wordt er een longfoto gemaakt om te zien of de infuuslijn op de juiste plaats zit.

Na het inbrengen wordt de infuuslijn op uw huid vastgemaakt met een speciale pleister (statlock) en daar overheen wordt een plastic folie (tegaderm) geplakt.



Afbeelding 2

Het eerste uur na inbrengen krijgt u een drukverband. De verpleegkundige verwijdt het drukverband na een uur. .

Verzorging van de PICC

De verzorging van de catheter vindt meestal in het ziekenhuis plaats. Deze verzorging wordt gecombineerd met een andere afspraak die u in het ziekenhuis heeft. Als u geen afspraken in het ziekenhuis heeft, wordt de catheter thuis verzorgd door een verpleegkundige van ons ziekenhuis (transmuraal team)

De catheter moet één keer per week doorgespoten worden. Ook wordt de folie (tegaderm) die erop geplakt zit één keer per week vervangen. De hechtpleister kan twee tot drie weken blijven zitten. Als de folie of hechtpleister loslaat belt u naar de oncologieverpleegkundige. Als uw catheter door het transmuraal team verzorgd wordt, belt u het transmuraal team.

Aandachtspunten

U mag douchen met de PICC catheter. Daarbij laat u de tegaderm en hechtpleister zitten. Voor het douchen doet u een stuk vershoudfolie om het infuus heen. Zo houdt u het infuus zo droog mogelijk. Na het douchen verwijderd u de folie weer. U mag niet zwemmen of in bad met de PICC

Uw bloeddruk mag niet gemeten worden aan de arm waar de PICC in zit. Uit bloedvaten van de arm waar de PICC is ingebracht mag geen bloed worden afgenomen. Meestal kan dit uit de PICC gehaald worden.

Als de verpleegkundige medicijnen inspuit via de catheter en dit is pijnlijk of u hoort geruis in uw oor, dan zegt u dit gelijk.

De oncologieverpleegkundige waarschuwen:

Als u thuis last krijgt van:

- Een mogelijke infectie rondom de insteekopening. U merkt dit aan roodheid, zwelling, warmte, pijn, vocht (pus);
- of als de catheter beschadigd is;
- of het afsluitdopje is losgeraakt;
- als uw arm/ schouder dik wordt;
- kortademigheid of pijn in uw longen;
- temperatuur boven 38,5 °C,

dan belt u de oncologieverpleegkundige. Het telefoonnummer staat op de eerste bladzijde van deze folder.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
april 2016
pavo 1143