

# Certolizumabpegol (Cimzia®)

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

# informatie

# Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u certolizumabpegol gaat gebruiken.

In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

## Werking van certolizumabpegol

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten. Eén daarvan is TNF-alfa. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er te veel TNF-alfa. Het medicijn certolizumabpegol blokkeert de werking van TNF-alfa. Hierdoor verminderen de ontstekingsklachten.

Certolizumabpegol kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afneemt en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

## Wanneer wordt certolizumabpegol voorgeschreven?

Certolizumabpegol kan voorgeschreven worden aan patiënten met reumatoïde artritis waarbij andere medicijnen onvoldoende helpen. Voorafgaand aan de behandeling met certolizumabpegol moet onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt onder andere in dat onderzocht wordt of u een tbc-infectie of hepatitis heeft of heeft gehad.

# Het gebruik van certolizumabpegol

## Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

## Injecties

- Certolizumabpegol wordt via injecties gegeven. U leert hoe u dit zelf kunt doen. Dit moet 1 keer per 2 weken gebeuren.
- De eerste drie injecties zijn een zogenaamde oplaaddosis. U heeft dan telkens twee injecties nodig (400 mg). Vanaf de vierde injectie neemt u telkens 200 mg.
- Certolizumabpegol werkt snel, soms al na 2 weken. Het duurt enkele weken voordat er voldoende resultaat is bereikt.
- Certolizumabpegol wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX).

## Controle

Tijdens de behandeling met certolizumabpegol wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd. Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Als u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met de certolizumabpegol-injecties.

# Bijwerkingen van certolizumabpegol

Hierna worden de meest voorkomende bijwerkingen beschreven:

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de reumaverpleegkundige.
- Certolizumabpegol geeft een grotere kans op infecties. Neem daarom uw temperatuur op als u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een wondje waar pus uitkomt, contact op met uw huisarts of reumatoloog en wacht met de injectie.
- Mogelijk is er een verhoogd risico op de ontwikkeling van kwaadaardige huidgezwellen. Bij het waarnemen van nieuwe vlekjes of veranderingen van vlekjes op de huid moet u dit doorgeven aan de reumatoloog.

## Zwangerschap en borstvoeding

Er is steeds meer bekend over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap. Overleg hierover met uw reumatoloog, ook als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven.

## Vaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinatie (griep prik) wordt aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts. We raden aan om andere vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

# Reisadvies

We raden u af om bij gebruik van certolizumabpegol naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

# Operaties

Als u geopereerd moet worden, moet u tijdelijk stoppen met de certolizumabpegol, in overleg met de reumaverpleegkundige. Als u diabetes heeft of geopereerd moet worden vanwege een infectie, kan antibiotica soms preventief worden gegeven. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de tandarts of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

# Bloedstollingstesten

Er zijn geen aanwijzingen dat behandeling met certolizumabpegol effect heeft op de bloedstolling. Toch kan certolizumabpegol de uitslag van bepaalde bloedstollingstesten beïnvloeden. Hierdoor is de uitslag onbetrouwbaar. Vertel uw arts of trombosedienst over uw behandeling met certolizumabpegol als u een bloedstollingsonderzoek moet ondergaan. Uw arts houdt dan rekening met de dosering van uw medicijnen.

# Gebruik van certolizumabpegol samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts over uw behandeling met certolizumabpegol.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
- Vertel bij uw apotheek ook altijd dat u certolizumabpegol gebruikt.

## Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van ReumaNederland, [www.reumanederland.nl](http://www.reumanederland.nl)

## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
augustus 2020  
pavo 0899