

# Golimumab (Simponi®)

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

# informatie

# Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u het medicijn golimumab gaat gebruiken.

In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als u nog vragen heeft, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

## Werking van golimumab

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten. Eén daarvan is TNF. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er teveel TNF. Het medicijn golimumab blokkeert de werking van TNF. Hierdoor verminderen de ontstekingsklachten.

Golimumab kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afneemt en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

## Wanneer wordt golimumab gebruikt?

Golimumab kan voorgeschreven worden aan patiënten met een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew waarbij andere medicijnen onvoldoende helpen.

Voorafgaand aan de behandeling met golimumab moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt onder andere in dat onderzocht wordt of u een tbc-infectie of hepatitis heeft of heeft gehad.

# Het gebruik van golimumab

## Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

## Injecties

- Golimumab wordt via injecties gegeven. U leert hoe u dit zelf kunt doen (met een zogenaamde prikpen). Dit moet meestal één keer per maand gebeuren.
- Golimumab wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX).
- Het effect van de behandeling met golimumab wordt na ongeveer 3 maanden door uw arts en/of reumaverpleegkundige met u besproken.

## Controle

Tijdens de behandeling met golimumab wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd. Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Als u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met de injecties.

# Bijwerkingen van golimumab

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de reumaverpleegkundige.
- Golimumab geeft een grotere kans op infecties. Neem daarom uw temperatuur op als u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een pussend wondje, contact op met uw huisarts of reumatoloog en wacht met de injectie.
- Mogelijk is er een verhoogd risico op de ontwikkeling van kwaadaardige huidgezwellen. Bij het waarnemen van nieuwe vlekjes of veranderingen van vlekjes op de huid moet u dit doorgeven aan de reumatoloog.

## Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

## Vaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinatie (griep prik) wordt aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts. We raden aan om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

## Reisadvies

We raden u af om bij gebruik van golimumab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

## Operaties

Als u geopereerd moet worden, moet u tijdelijk stoppen met de golimumab, in overleg met de reumaverpleegkundige. Als u diabetes heeft of geopereerd moet worden vanwege een infectie, kan antibiotica soms preventief worden gegeven. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de tandarts of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

## Gebruik van golimumab samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts over uw behandeling met golimumab.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
- Vertel bij uw apotheek ook altijd dat u golimumab gebruikt.

### Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van ReumaNederland, [www.reumanederland.nl](http://www.reumanederland.nl)

# Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust Van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 -16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
augustus 2020  
pavo 0901