

Hydroxychloroquine (Plaquenil®)

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u het medicijn hydroxychloroquine gaat gebruiken.

In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking en toepassing

Hydroxychloroquine is een zogenaamde DMARD (disease modifying anti rheumatic drug). Oftewel een reumabestrijdend medicijn. Hydroxychloroquine wordt voorgeschreven aan patiënten met een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis en systemische lupus erythematosus.

Hydroxychloroquine heeft een ontstekingsremmend effect. Het kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Het duurt ongeveer drie maanden voordat u wat gaat merken van de werking van dit medicijn. Dit medicijn wordt vaak met andere medicijnen gecombineerd. Als blijkt dat u goed op hydroxychloroquine reageert, kunt u het vele jaren blijven gebruiken.

Het gebruik van hydroxychloroquine

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Tabletten

Hydroxychloroquine is een medicijn in de vorm tabletten van 200 mg. De dosering kan variëren van 1-3 tabletten per dag. De dosering is afhankelijk van uw ziekteactiviteit. Meestal is de voorgeschreven dosering in het begin van de behandeling hoger en wordt er later overgegaan op een lagere dosering.

- U mag de tablet niet fijnmaken of erop kauwen.
- Als u het medicijn tijdens of net na een maaltijd neemt, heeft u minder kans op misselijkheid.
- Stop niet zomaar met het gebruik van hydroxychloroquine. Overleg dit eerst met uw reumatoloog.

Bijwerkingen

In de bijsluiter van uw apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die ooit zijn voorgekomen. De meeste bijwerkingen komen zelden voor.

- De meest voorkomende bijwerking is dat de huid gevoeliger wordt voor de zon. Het gebruik van een zonnebrandcrème (hoge beschermingsfactor) is daarom aan te raden.
- Maagdarmklachten zoals misselijkheid, braken en diarree komen soms voor.
- Lichte overgevoeligheidsreacties, zoals huidafwijkingen (uitslag) zijn zeldzaam.
- Oogafwijkingen treden alleen op bij hoge doseringen en bij langdurig gebruik.
- Duizeligheid, hoofdpijn, spierzwakte, bloedaafwijkingen en psychische klachten komen zelden voor.

Heeft u last van een bijwerking of andere lichamelijke klachten? En vraagt u zich af of ze met de hydroxychloroquine te maken hebben? Neem dan contact op met uw huisarts of reumatoloog.

Controle

Als u langdurig een hoge dosis hydroxychloroquine gebruikt, kan uw reumatoloog u adviseren uw ogen te laten controleren door een oogarts. Ook in het begin van deze behandeling is het mogelijk dat u naar de oogarts verwezen wordt.

Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg treden zelden op. Ook spierklachten en spierzwakte zijn zeldzame bijwerkingen. De reumatoloog controleert uw bloed hierop. Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Als u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met het gebruik van hydroxychloroquine.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Hydroxychloroquine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.

Meestal kunt u dit medicijn ook tijdens de zwangerschap gebruiken. Het medicijn komt ook in de borstvoeding terecht. Als u een zwangerschap overweegt of borstvoeding wilt geven overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

Dit medicijn heeft geen invloed op de griepvaccinatie (griep prik) en alle andere vaccinaties.

Alcohol

Alcohol heeft geen nadelig effect op de werking (en bijwerkingen) van hydroxychloroquine.

Gebruik van hydroxychloroquine samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met Hydroxychloroquine. Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van ReumaNederland, www.reumanederland.nl

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2020
pavo 0902